

Pestorin Mormyx

Compoziția:

1 ml (1 doză):

Componenta lichidă:

Calicivirus septemiciae haemorrhagiae cuniculi (solutio organorum) minim 128 HA
hidroxid de aluminiu
tiomersal
ser fiziologic tampon

Componenta liofilizată:

Poxvirus myxomatosa attenuatum 10^{3,3} TCID₅₀
mediu de cultură MEM
mediu de liofilizare

Modul de acțiune

Antigenii conținuți în vaccin, odată administrați în organismul animal, determină formarea de anticorpi specifici, care protejează apoi individul de boala hemoragică și mixomatoză. Imunitatea postvaccinală completă se instalează în nouă zile în cazul mixomatozei și în 10 zile în cel al bolii hemoragice, persistând pentru o perioadă de un an în cazul bolii hemoragice și pentru șase luni, în cazul mixomatozei.

Indicații

Pentru vaccinarea preventivă a iepurilor clinic sănătoși împotriva bolii hemoragice și a mixomatozei, printr-o singură inoculare. Se recomandă următorul protocol de vaccinare:

- Iepurii trebuie vaccinați la vârsta de 10 săptămâni.

Vaccinarea poate fi efectuată mai repede în următoarele cazuri:

Imunizarea cu vaccinul monovalent împotriva mixomatozei (Myxoren) poate fi efectuată de la vârsta de 4 săptămâni, urmată de revaccinare cu produsul Pestorin Mormyx, care nu trebuie administrat mai repede de vârsta de 6 săptămâni. Între cele două vaccinări trebuie păstrată o perioadă de cel puțin 2 săptămâni.

Imunizarea cu vaccinul Pestorin Mormyx poate fi efectuată începând cu vârsta de 6 săptămâni, urmată de revaccinare peste 4 săptămâni.

Revaccinări ulterioare cu produsul Pestorin Mormyx se recomandă a fi efectuate în efectivele de animale la intervale de 6 luni.

Având în vedere frecvența sezonală, animalele trebuie vaccinate (revaccinate) din timp, pentru a li se asigura întreaga imunitate de-a lungul perioadei critice a incidenței bolii.

Contraindicații

A nu se folosi la animalele bolnave și caectice. Iepurițele gestante nu trebuie vaccinate în ultima săptămână de sarcină, datorită riscului manipulării lor bruște și violente.

Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Nu se cunosc.

Speciile țintă

Iepurii domestici.

Dozarea pe specie, calea și metoda de administrare

Doza: 1 ml indiferent de mărimea animalului.

Administrarea: Injectie S.C.

Precauții speciale pentru utilizare

Agitați bine componenta lichidă. Diluați liofilizatul în componenta lichidă. După reconstituire, vaccinul trebuie administrat în 2 ore de la diluare.

Timp de așteptare

Datorită unei reacții locale posibile, iepurii nu trebuie abatați pentru consum uman mai repede de 7 zile.

Păstrare

Depozitați la temperaturi de 2 – 8°C. Nu înghețați produsul! A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

Atenționări speciale: Nu sunt.

Precauții speciale pentru manipularea produselor medicinale veterinare nefolosite și a deșeurilor derivate de la asemenea produse

Orice produs medicinal veterinar nefolosit sau deșeu derivat de la asemenea produse, trebuie manipulat conform reglementărilor locale.

Prezentare

1 flacon x 1 doză
5 flacoane x 1 doză
10 flacoane x 1 doză
1 flacon x 5 doze
5 flacoane x 5 doze
10 flacoane x 5 doze
1 flacon x 10 doze
5 flacoane x 10 doze
10 flacoane x 10 doze
1 flacon x 20 doze
5 flacoane x 20 doze
10 flacoane x 20 doze

Valabilitate

24 luni.

Producător:

Bioveta S.A., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă.