

Caniverm tabl. ad us. vet.

Produs antiparazitar pentru câini, pisici, feline și canide.

Compoziția:

1 tabletă – 0,7 g:

-Fenbendazol 150 mg, Pyrantel emboat 144 mg, Praziquantel 50 mg, substanță pentru 1 tabletă.

1 tabletă – 0,175 g:

-Fenbendazol 37,5 mg, Pyranteli emboat 36,0 mg, Praziquantel 12,5 mg, substanță pentru 1 tabletă.

Acțiune:

Fenbendazolul ajunge pe cale orală la paraziți și blochează polimerizarea proteinei structurale a tubulinei, în interiorul axonilor nervilor, interferând cu funcția de transport a celulelor de absorbție a parazitului.

Pyrantel pamoat acționează ca și un antagonist nicotin-colinergic în ganglioni, care determină paralizii neuro-musculare spastice ale parazitului.

Praziquantel crește permeabilitatea membranelor celulare pentru ionii de calciu, care determină contracții musculare ale parazitului.

Indicații:

Parazitoze determinate de nematode și trematode la câini, pisici, feline și canide: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps* și *Mesocestoides spp.*

Contraindicații:

Cisticercozele oculare și neurocisticercidozele spinale. Tulburări hepatice.

Interacțiuni:

A nu se administra simultan cu preparate pe bază de piperazină sau alți agenți antiparazitari.

Calea de administrare:

A se administra pe cale orală. Tabletele pot fi administrate separat sau înglobate într-o bucată de mâncare. Se administrează o singură doză. Nu se administrează împreună cu lactate.

Felinelor și canidelor din grădinile zoologice, circuri etc. se recomandă administrarea produsului sub formă spartă și înglobată în bucăți de carne care se dau în tainul de dimineață în cuști, corespunzător numărului de animale.

Dozarea:

Căței, câini de talie mică și pisici:

- 1 tabletă 0,175 g/ 0,5 – 2 kg greutate corporală,

- ½ tabletă 0,7 g sau 2 tablete 0,175 g/ 2 – 5 kg greutate corporală.

Câini de talie mijlocie:

- 1 tabletă 0,7 g sau 4 tablete 0,175 g/ 5 – 10 kg greutate corporală.

Câini de talie mare sau carnivore mari:

- 1 tabletă 0,7 g pentru fiecare 10 kg greutate.

Efecte secundare:

După administrare se pot produce stări de vomă, urticarii.

Acestea sunt reacții la proteinele rezultate din moartea paraziților și nu se datorează reacției la medicament.

Prezentare:

Tablete a 0,7 g: 1 cutie cu 6 tbl., 1 cutie cu 100 tbl.

Tablete a 0,175 g: 1 cutie cu 6 tbl.

Precauții:

La cățele gestante este necesară calcularea exactă a dozei de administrare. La căței se recomandă administrarea preparatului începând cu vârsta de 3 săptămâni de viață apoi cu regularitate la fiecare 3 luni.

Deșeurile:

Deșeurile sau flacoanele goale vor fi manipulate conform reglementărilor locale în vigoare.

Păstrarea:

În loc uscat și întunecos, în ambalajul original la temperaturi de până la 25°C.

A se feri de lumină !

Nu utilizați produsul după data expirării trecute pe etichetă.

Valabilitate:

2 ani de la data fabricației.

Producător:

Bioveta S.A., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !