

SERGON PG 400+200 inj. sicc. ad us. vet.

Compoziția:

Fiecare doză conține:

Liofilizatul:

Gonadotropinum sericum equinum 400 UI,
Gonadotropinum chorionicum 200 UI,

Diluant (2 ml):

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus, Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, Aqua pro injectione.

Excipienți:

Liofilizatul:

Mannitolum, Natrii dihydrogenophosphas dihydricus, Natrii hydrogeno-phosphas dodecahydricus.

Indicații:

Tratarea anestrului, inducerea estrului, sincronizarea gestației la scroafe și la scrofițe.

Contraindicații:

Nu se cunosc.

Reacții adverse:

Nu se cunosc.

Specii țintă:

Scroafele, scrofițe.

Posologie pentru fiecare specie, căi de administrare și mod de administrare:

Atât pentru utilizarea dozelor unice cât și a celor multidoze, se amestecă diluantul cu conținutul liofilizat într-o seringă. Agitați amestecul până la diluarea completă. Administrați apoi o doză (2 ml) înăpoia urechii, intramuscular sau subcutanat.

Schema de administrare:

Speciile țintă	Indicații	Durata de administrare
Scroafe	Inducerea ciclului	0 – 2 zile după înțarcare
	Creșterea numărului de pureci fătați	0 – 2 zile după înțarcare
	Anestru/subestru	La aproximativ 10 zile după înțarcare
Scrofițe	Anestru/subestru	La vârsta de 8 – 10 luni
	Inducerea estrului	La vârsta de 5.5 – 6.5 luni sau la greutatea corporală de 85 – 100 kg. Scrofițele pot fi inseninate în timpul primului estru consecutiv administrării. Dacă inseminarea are loc doar după al doilea estru consecutiv administrării, ne putem aștepta la o fătare cu un număr mare de purcei.

Nota: Declanșarea estrului are loc la 3-6 zile după administrare.

Recomandări privind administrarea corectă:

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu este cazul. Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale. Prepararea soluției pentru administrare: dizolvați liofilizatul într-un volum mic de diluant agitând încontinuu până când liofilizatul s-a dizolvat în totalitate, apoi adăugați restul de diluant. Pentru utilizator: se vor respecta principiile de asepsie la manipularea produsului. Nu sunt necesare măsuri speciale.

Timp de așteptare:

Nu este cazul.

Precauții speciale pentru depozitare:

Depozitați la întuneric și în loc uscat, la temperatură de 2°C până la 15°C. Soluția preparată trebuie păstrată într-un loc uscat și întunecos, la temperatura de 2°C până la 8°C. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Atenționări specială:

Nu există

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Alte informații:

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare 3 ani. Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: soluția preparată trebuie administrată în 12 ore.

Nu utilizați după data expirării înscrisă pe ambalaj.

Ambalaje cu doze simple:

5 x 1 doze de liofilizat + 5 x 2 ml de diluant,

10 x 1 doze de liofilizat + 10 x 2 ml de diluant.

Ambalaje multidoze:

5 x 5 doze de liofilizat + 5 x 10 ml de diluant,
5 x 10 doze de liofilizat + 5 x 20 ml de diluant,
6 x 20 doze de liofilizat + 6 x 40 ml de diluant.
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Numai pentru uz veterinar !
Se eliberează pe bază de prescripție medicală !