

Rehydrosol Bio

plv. sol. ad us. vet.

Produs veterinar dietetic și rehidratant pentru viței

Previne deshidratarea și acidoza și asigură necesarul de electroliți în caz de pierderi cauzate de diareea provocată de diferiți agenți nutriționali, bacteriali, virali sau în caz de criptosporidioză.

Compoziție

1 plic conține (83.7 g):

Natrii citras anhydricus	3.92 g
Natrii acetat anhydricus	3.28 g
Natrii propionat	1.92 g
Kalii chloridum	2.98 g
Natrii chloridum	4.68 g
Kalii dihydrogenophosphas	1.36 g
Flavum orangeatum	
Silica colloidalis anhydrica	
Glucosum anhydricum	

Caracteristicile produsului / utilitate

Acest produs previne deshidratarea și acidoza și asigură necesarul de electroliți în caz de pierderi cauzate de diaree provocate de diferiți agenți nutriționali, bacteriali, virali sau în caz de criptosporidioză.

Doză și mod de administrare

Un plic reprezintă o doză. Produsul este destinat pentru administrare orală. Pentru fiecare administrare se prepară o soluție proaspătă, doza fiind un plic la 2 litri apă caldă (30-37°C). În momentul dizolvării produsului sedimente nedizolvate pot apărea în amestec. Aceste sedimente nu afectează calitatea produsului.

Dozare

1) Primele semne de diaree

Oprți administrarea de lapte sau lapte praf.

Ziua 1 și 2: 4 litri de soluție pe zi = 2 x (2l de apă + Rehydrosol Bio), administrat în 2 reprize.

Ziua 3 și 4: 4 litri de soluție pe zi = 2 x (1l de apă + 1l de lapte praf + Rehydrosol Bio), administrat în 2 reprize.

După tratament continuați hrănirea normală.

2) În caz că diareea continuă sau se agravează

Cauzând deshidratare serioasă administrați 2 litri de soluție de 3 x 4 ori pe zi. A nu se administra soluția mai mult de 4 zile consecutive.

După ce acest produs este folosit se recomandă hrănirea normală în continuare.

Atenționări

După ce acest produs este folosit se recomandă hrănirea normală în continuare. Nu utilizați soluția dacă este contaminată cu alte substanțe. Preparatul trebuie consumat în termen de 24 ore. În cazurile grave se recomandă un tratament i.v. alternativ. În cazuri de agravare ce țin mai mult de 4 zile consultați medicul veterinar. Păstrați recipientii curați și nu hrăniți animalele mai mult decât este necesar. Folosiți colostru de calitate.

Valabilitate

A se păstra la temperaturi de sub 25°C.

Perioada de valabilitate este de 24 luni.

Preparatul trebuie folosit în decurs de 24 de ore după dizolvare.

Ambalaj

83,7 g (o plic)

Mod special de păstrare

A se păstra la temperaturi de sub 25°C.

A nu se păstra la îndemâna copiilor.