

# Sulfadimidin Bioveta

plv. sol. ad us. vet.

## Compoziția

Sulfadimidină sodică 20 g per plic.

## Forma farmaceutică

Pulbere pentru administrare orală.

Sulfadimidinele au următoarele efecte: Efect bacteriostatic asupra bacteriilor Gram-pozitive și Gram-negative (*Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *E.coli*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma spp.*). Grupul funcțional al sulfonamidelor are efect de inhibare competitiv al acidului p-aminobenzoic, care este un factor de creștere al microorganismelor. Împotriva Coccidia (*E. necatrix*, *E. tenella*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. stiedae*, *E. ovinoidalis*, *E. adenoides*, *E. meleagridis*, *E. praecox*, *E. mitis*, *E. bovis*, *E. zuernii*, *Isospora suis*) la păsări, iepuri, viței, porci, miei. Acționează asupra generației a doua de schizonti.

## Speciile țintă

Păsări, iepuri, viței, porci, miei.

## Indicații

Coccidioze, în special la păsări și iepuri. Tratamentul bolilor infecțioase cauzate de germeni sensibili la sulfadimidin. Tratamentul de întreținere consecutiv administrării injecțiilor cu sulfadimidin.

## Contraindicații

Boli renale, hepatice, sanguine și polinevrite.

## Precauții speciale

Nu întrerupeți tratamentul chiar dacă se instalează ameliorarea după administrarea primei doze.

Utilizați o soluție proaspătă în fiecare zi !

## Interacțiuni

Nu administrați simultan cu sulf și compușii săi, anestezice procainice și combinații de medicamente cum ar fi procain-penicilină, metenamină (hexameten tetramină) sau doze mari de vitamina B, pentru a nu diminua efectul medicamentului.

## Doza

Dizolvați 1 plic în 10 l apă potabilă și administrați-l timp de 3 zile în apa de băut. Dacă este necesar, repetați acest tratament la un interval de 3 zile. Administrarea preventivă la iepuri se recomandă începând cu vârsta de 5 – 10 săptămâni, cel mai bine după o pauză de 2 – 3 zile fără apă de băut și furaje proaspete.

## Calea de administrare

Orală, în apa de băut.

## Efecte secundare

Nu se cunosc efecte secundare.

## Păstrare

Păstrați într-un spațiu uscat, la temperaturi de 0 - 25 °C, ferit de lumină.

A se feri de accesul copiilor.

## Prezentare

1 plic x 20 g, 5 plicuri x 20 g.

## Timp de așteptare

Carne - 15 zile.

Nu utilizați la găinile ouătoare ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

## Precauții speciale pentru manipularea deșeurilor

Materialele și produsele rămase trebuie manipulate conform reglementărilor naționale în vigoare.

Nu utilizați produsul după expirarea valabilității înscrise pe ambalaj.

## Valabilitate

36 luni de la data fabricației.

## Data ultimei revizii a textului

18.06.2007

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

A SE ELIBERA NUMAI PE BAZĂ DE PRESCRIȚIE MEDICALĂ

## Numărul autorizației de comercializare

070040 din 05.03.2007

## Producător

Bioveta, a.s.Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Republica Cehă.