

AMOXINEOVIT C

comprimate pentru găini și câini

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

Șos. Centurii nr. 7

077190 Voluntari, jud. Ilfov

România

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

AMOXINEOVIT C, comprimate pentru găini și câini
Oxitetracilină clorhidrat, amoxicilină trihidrat, neomicină sulfat.

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Substanțe active:

Oxitetracilină clorhidrat	12 mg/cpr.
Amoxicilină trihidrat	9,6 mg/cpr.
Neomicină sulfat	9,6 mg/cpr.

4. INDICAȚII

Produsul este recomandat la găini și câini în tratamentul unor infecții bacteriene produse de germeni sensibili la substanțele active:

- **la găini** - infecții colibacilare, pasteurelice, stafilococice, streptococice, salmonelice (puloroză), enterotoxiemii anaerobe.
- **la câini** - enterită colibacilară, infecții salmonelice, infecții respiratorii (tușea de canisă - Bordetella bronchiseptica), clostridioză.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Găini și câini.

8. DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează individual, pe cale orală în următoarele doze:

- **la găini:** doza este de 1 comprimat pe kg masă corporală și zi timp de 5 - 7 zile consecutiv.
- **la câini:** se administrează 1 comprimat / 1,5 kg masă corporală și zi timp de 7 zile consecutive

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pentru a asigura o dozare corectă, trebuie determinată cât mai bine greutatea corporală a animalelor, pentru a evita subdozarea.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Came și organe: 28 zile.

Nu este autorizată utilizarea la găinile care produc oua pentru consum uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C, în ambalajul original A nu se utiliza după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Datorită variabilității (de timp, geografice) în materie de susceptibilitate a bacteriilor în cazul utilizării produsului, se recomandă recoltarea de probe bacteriologice și efectuarea testelor de susceptibilitate pentru microorganismele izolate de la animalele bolnave.

Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale (regiune, fermă) referitoare la sensibilitatea bacteriilor ținta.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la substanțele active și poate duce la scăderea eficacității tratamentului datorită potențialului de rezistență încrucișată.

La utilizarea produsului vor fi luate în considerare politicile oficiale și locale privind produsele antimicrobiene.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingerare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta.

Utilizare în perioada de gestație și lactație sau în perioada de ouat

Se poate utiliza în perioada de gestație și lactație.
Nu este autorizată utilizarea la găinile care produc oua pentru consum uman.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Animalele tratate se vor menține în adăposturi pe toată perioada tratamentului iar dejecțiile colectate nu se vor utiliza la fertilizarea solului.

14. DATA CÂND A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Decembrie 2016.

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiuni de ambalaj: Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de înaltă densitate cu 50 și 100 comprimate sau blistere plastificate cu 10 comprimate. Flacoanele sunt închise cu dopuri polietilenă de înaltă densitate.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medical veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.