

AviPro IBD Xtreme

Vaccin viu, tulpina intermediar-plus, liofilizat, pentru vaccinarea păsărilor împotriva bursitei infecțioase aviare.
- pentru administrarea în apa de băut, prin aerosolizare, aplicare oculoconjunctivală (+solvent).

Compoziție

O doză conține:
min. 1,5 log₁₀ ELD₅₀ de virus bursitic atenuat, tulpina V271.

Sistemul de multiplicare

Fibroblaste de embrioni de pui SPF.

Indicații

Pentru imunizarea activă a puilor împotriva bursitei infecțioase aviare.
Răspuns imun excelent la un nivel al atc. maternali decelați prin ELISA de 600-800 în momentul vaccinării.

Contraindicații

Nu se vaccinează păsările slăbite sau cele bolnave.
Nu se vaccinează în perioada de ouat.

Efecte secundare

Nu se cunosc.

Interacțiuni cu alte medicamente

Nu se cunosc.

Doze și mod de administrare

Se administrează o doză per pui.

Broileri:

Începând cu ziua a 7-a de viață pentru puii proveniți din părinți nevaccinați cu vaccin antibursitic inactivat.

Începând cu ziua a 12-a de viață pentru puii proveniți din părinți vaccinați cu vaccin antibursitic inactivat.

Hibridi ouători:

La vârsta de 14-21 zile.

Vaccinul reconstituit se va folosi în maxim 2 ore.

Administrarea în apa de băut: se recomandă, pentru un răspuns imunologic foarte bun, folosirea produsului AviBlue pentru îmbunătățirea calitativă a apei în care se face vaccinarea.

Perioada de așteptare

Nu este cazul.

Notă:

A se proteja vaccinul de acțiunea directă a razelor solare.

A se avea grijă de a se evita contactul cu ochii, întrucât este un vaccin viu!

Flacoanele deschise și cele goale, se vor distruge în siguranță.

Păstrare

La temperaturi cuprinse între +2°C și +8°C.

Prezentare

Pachete cu 10 x 1.000 doze.

Pachete cu 10 x 2.500 doze.