

## Osteocicatrat TR

adjuvant în tratamentul rănilor și afecțiunilor osoase, cu aplicare externă

### 1. COMPOZIȚIE pentru 100 g

Extract de rădăcină de <i>Symphytum officinale</i> (tătăneasă)	5 g
Extract de plantă de <i>Chelidonium majus</i> (rostopască)	5 g
Vaselină neutră (excipient) ad 100 g	

### 2. ACȚIUNE FARMACOLOGICĂ

Extractul de *Symphytum officinale* (tătăneasă) conține principii active (alantoină, taninuri catehice, numeroși aminoacizi, alcaloizi) care contribuie la refacerea rapidă a calusului osos și au acțiune antiinflamatorie la nivelul articulațiilor.

Extractul de *Chelidonium majus* (rostopască) conține alcaloizi cu acțiune calmantă la nivelul pielii și cu efecte antibacteriene și antimicotice.

### 3. SPECII ȚINTĂ

Feline, canide

### 4. INDICAȚII

Se recomandă ca adjuvant în tratamentul afecțiunilor pielii: plăgi cutanate produse prin înțepare, tăiere, arsură, degerătură, ulcer varicos, eczeme greu vindecabile, papilomatoză (regenerarea țesutului epitelial după extirparea papiloamelor).

De asemenea, se recomandă ca adjuvant în tratamentul unor afecțiuni osoase: entorse, luxații, dureri articulare, reumatism (acelerează formarea calusului osos).

### 5. CONTRAINDICAȚII

Nu există.

### 6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

### 7. MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se aplică pe zona afectată în strat subțire, de 2 – 3 ori pe zi, timp de 4 – 5 zile.

Administrarea produsului se poate prelungi până la 14 zile în afecțiunile grave, fără riscul producerii unor complicații secundare.

### 8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

### 9. MOD DE PREZENTARE

Tuburi conținând 30 g sau 50 g.