

## AviPro 104 MG

**Vaccin inactivat sub formă de emulsie uleioasă, pentru vaccinarea păsărilor împotriva infecției cu *Mycoplasma gallisepticum*.**  
- pentru administrare prin injecții intramusculare sau subcutanate.

### Compoziție

O doză (0,5 ml) conține:  
min. 10<sup>9</sup> CFU *Mycoplasma gallisepticum*, tulpina S6,  
max. 0,05 mg thiomersal,  
max. 0,40 ml ulei adjuvant.

### Indicații

Pentru imunizarea activă a găinilor pentru reproducție și a găinilor ouătoare, împotriva micoplasmozei.

### Contraindicații

Se va evita injectarea intravenoasă.  
Nu se vaccinează păsările clinic bolnave și cele slăbite în urma transportului.

### Efecte secundare

Nu se cunosc.

### Interacțiuni cu alte medicamente

Nu se cunosc.

### Doze și mod de administrare

Se injectează câte 0,5 ml emulsie vaccinală la fiecare pasăre, intramuscular (în musculatura pectorală) sau subcutanat (în zona de mijloc sau inferioară a gâtului).  
Atât înainte cât și în momentul folosirii, se va agita bine flaconul de vaccin.

### Schema de vaccinare

Prima vaccinare: la vârsta de 6-8 săptămâni. Pentru loturile cu risc crescut de infecție, imunizarea se va face la vârsta de 6 săptămâni.

A doua vaccinare: la vârsta de 14-16 săptămâni.

Înainte de folosire vaccinul trebuie să ajungă la temperatura de 18-20°C.

Se agită bine flaconul, atât înainte cât și în timpul administrării.

### Perioada de așteptare

Nu este necesară.

### Păstrare

La temperaturi cuprinse între +2°C și +8°C.  
Nu se va congela flaconul de vaccin.

### Ambalare

Flacoane a 1.000 doze (500 ml).