

Predef[®] 2X

Suspensie apoasă sterilă de corticosteroizi.

Prezentare

Fiecare ml de Predef 2x, suspensie apoasă sterilă conține 2 mg de isoflupredon acetat, 4,5 mg citrat de sodiu, 120 mg polietilen glicol 3350, 1 mg povidon și conservant.

Se administrează pe cale intramusculară sau intrasinovială și este indicat în situațiile ce necesită o terapie cu glucocorticoizi pentru efectul anti-inflamator sau de susținere.

PREDEF 2X este un glucocorticoid obținut în laboratoarele Upjhon ce are o activitate glucocorticoidă mai mare decât o cantitate egală de prednisolon.

Activitatea glucocorticoidă este de aproximativ 10X mai mare decât a prednisolonului, de 50X mai mare decât a hidro cortizonului și de 67X mai mare decât a cortizonului măsurată în depozitele de glicogen de la nivelul ficatului.

Flacoane de 100 ml de suspensie apoasă conținând 2 mg/ml de isoflupredon.

Indicații

Bovine – Cetoză

Predef 2X prin efectul său gluconeogenetic și de stocare a glicogenului este un tratament eficient al tulburărilor endocrine și de metabolism ce însoțesc cetoza primară.

În cazul cetozei secundare, în care starea generală este agravată de infecții secundare ca: pneumonie, mastită, endometrită, gastrită traumatică, etc., Predef 2X trebuie utilizat concomitent cu un tratament de susținere, local și general.

Afecțiuni musculo-scheletale

Ca și alți steroizi, acest preparat poate fi utilizat cu succes pentru ameliorarea durerii asociate afecțiunilor articulare (artrite) la animalele de talie mare. Poate fi folosit în tratamentul: laminitelor reumatoide și al artritelor traumatiche, osteoartritelor, periostitelor, tendinitelor tenosinovitelor, bursitelor și miozitelor.

Alergii

Efectele benefice ale medicamentului sunt evidente în cazul reacțiilor de hipersensitivitate de natură iatrogenică sau ca urmare a expunerii animalului la un alt agent alergen. Manifestările uzuale sunt reacțiile de tip anafilactic și urticaria. Reacțiile alergice minore ca: dermatitele de contact sau topice, eczemele solare și conjunctivitele alergice pot fi și ele tratate.

Infecții supraacute și stări toxice

La animalele muribunde cu infecții supraacute severe pentru care există o terapie antiinfecțioasă specifică (pneumonii, peritonite, endometrite, mastite septice), administrarea intensivă a Predef 2X poate corecta tulburările circulatorii prin contracararea efectelor inflamatorii permițând astfel antibioticelor să-și exercite efectul terapeutic.

Șoc

Predef 2X este indicat în toate stările de șoc asociate cu traumatisme severe sau leziuni grave, reacții anafilactoide și în cazul operațiilor chirurgicale laborioase însoțite de riscuri.

Alte indicații

Distocii, retenții placentare, inflamații oculare, mușcăături de șarpe, intervenții ale diversilor agenți stresanți.

Poate fi utilizat cu succes, ca terapie ajutătoare, în cazul parezelor ante-partum, febrei vitulere.

Precauții

Animalele destinate consumului uman nu vor fi sacrificate decât după o perioadă de 7 zile de la ultimul tratament.

Doze și căi de administrare

Predef 2X poate fi administrat pe cale intramusculară profundă pentru efectul sistemic sau în cavitățile intraarticulare, teci sinoviale sau burse sinoviale pentru efectul local.

Bovine - Administrarea uzuală este intramusculară, doza fiind de 10 – 20 mg. Această doză poate fi repetată la 12-24 de ore dacă este necesar.

Cabaline - Doza pentru administrare intramusculară este de 5 – 20 mg, repetată dacă este necesar. În cazul administrărilor intrasinoviale sau intraarticulare, doza este de 5 – 20 mg sau mai mult, în funcție de mărimea cavității ce urmează a fi injectată.

Suine - Administrare intramusculară. Doza – 5 mg pentru un animal de 150 kg.

Condiții de depozitare

La temperatura camerei. Nu se va depăși temperatura de 25° C.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !