

Farmatan

antidiareic

Compoziție

100g pulbere conțin 55g extract de tanin obținut din castane dulci.

Indicații

Taninul are un efect astringent și precipită proteinele formând în contact cu intestinul un strat superficial insolubil care protejează mucoasa împotriva iritațiilor, împiedică resorbția substanțelor dăunătoare, reduce peristaltismul și pierderile de lichide la acest nivel, prevenind deshidratarea. Prin proprietățile sale coagulante taninul reduce hemoragiile la nivel intestinal. **Farmatan** are și un efect antiseptic datorat efectelor sale asupra proteinelor din structura microorganismelor. Produsul îmbunătățește sporul în greutate și rata de conversie a hranei la toate categoriile de animale domestice (porcine, bovine, păsări, iepuri) având și un efect antidiareic.

Doze și mod de administrare

Produsul se administrează în hrană sau în apa de băut astfel:

Purcei: 0,2-0,3 g/ kg mc sau 3-5 kg/ tonă de furaj timp de 21 de zile începând cu ziua a V-a postînțarcare.

Porci la îngrășat: 0,2-0,3 g/ kg mc sau 3-5 kg/ tonă de furaj timp de 10 zile.

Viței: 0,2 g/ kg mc sau 20-40 g/ animal/ zi timp de 3-4 zile în apa de băut

Vaci: 0,2 g/ kg mc sau 40-160 g/ animal/ zi timp de 3-4 zile în apa de băut. Doza zilnică se fracționează în două prize.

Păsări: 0,5 kg/ 1 tonă furaj în primele 7 zile și 1 kg/ 1 tonă furaj peste 7 zile de la broileri;

0,02-0,1 g/ pasăre timp de 5 - 7 zile;

50-70 g/ 100 l apă de băut timp de 5 - 7 zile.

Iepuri: 0,35-0,75 g/ animal/ zi în apa de băut sau 5-10 kg/ 1 tonă de furaj timp de 2 - 3 săptămâni după înțarcare.

Contraindicații

Constipații sau stări de anemie.

Timp de așteptare

Nu este cazul.

Numai pentru uz veterinar.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Producător

Tanin Sevnica, Slovenia.