

# Drontal Puppy

suspensie orală, căței și câini tineri

## Compoziție

### Substanțe active:

Febantel	15.00mg/ml,
Pirantel embonat	14.40mg/ml;

### Excipienți:

Benzoat de sodiu	2.05mg/ml,
Propionat de sodiu	2.05mg/ml,
Ponceau 4R (E124)	0.25mg/ml.

## Indicații

Medicament utilizat în nematodozele cățeilor și câinilor tineri. Pentru tratamentul infestațiilor cu nematode determinat de:

Ascarizi	- <i>Toxocara canis</i> ,
	- <i>Toxascaris leonina</i> ;
Viermi cu cârlig	- <i>Uncinaria stenocephala</i> ,
	- <i>Ancylostoma caninum</i> ;
Viermele bici	- <i>Trichuris vulpis</i> .

## Contraindicații

A nu se utiliza simultan cu compuși care conțin piperazină.

## Reacții adverse

Nu se cunosc.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

## Specii țintă

Pentru căței și câini tineri.

## Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare

### Dozare

Doza recomandată este de 15 mg febantel și 14,4 mg pirantel embonat / kg greutate vie. Aceasta corespunde la 1 ml de suspensie pe 1 kg greutate vie.

*Administrarea și durata tratamentului:* Administrare orală.

*Durata utilizării:* Un singur tratament.

## Recomandări privind administrarea corectă

Suspensia poate fi administrată direct cu ajutorul pompiței dozator sau poate fi amestecată în hrana animalului. Nu este necesară dietă.

A se agita înainte de utilizare.

Dacă infestarea s-a produs pe cale intrauterină sau trans-mamară, apariția ascarizilor poate apare la câini de la vârste fragede. De aceea este recomandat ca tratamentul să înceapă la vârsta de 2 săptămâni și să fie repetat la interval de două săptămâni până la vârsta de 12 săptămâni.

## Timpe de așteptare

Nu este cazul, acest produs nu este indicat pentru tratament la animalele care produc alimente pentru consum uman.

## Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă, cutie {EXP}. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 10 săptămâni.

## Atenționări speciale

### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu există.

### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Spălați mâinile după utilizare.

### Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## Alte informații

### Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon de 50ml, din polietilenă de înaltă densitate de culoare alb, capac cu filet de culoare alb, din polipropilenă cu seringă din plastic de 5ml și prospect toate incluse într-o cutie de carton. Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.