

Oxifuran Vitaminizat

premix medicamentat pentru păsările de colivie și volieră, câini și pisici

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

S.C. Romvac Company S.A., Șoseaua Centurii, nr. 7, Voluntari, județul Ilfov, România. Tel.: 021.350.31.06, Fax: 021.350.31.10

e-mail: romvac@romvac.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OXIFURAN VITAMINIZAT, premix medicamentat pentru păsările de colivie și volieră, câini și pisici.

Oxitetraciclină clorhidrat, furazolidonă.

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Substanțe active

Oxitetraciclină clorhidrat 140 mg/g

Furazolidonă 40 mg/g

Excipienți

Substrat vitamino-mineral (vitamina A, Vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, acid D pantotenic, biotină, vitamina C, metionină, magneziu, zinc, lactoză), carbonat de calciu, soia.

4. INDICAȚII

Se utilizează în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul coccidiozei micoplasmozei, colibacilozei și salmonelozei la păsări de colivie și volieră, câini și pisici.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se administrează la palmipede (rața mandarin).

Nu se administrează la porumbeii și fazanii destinați consumului uman.

6. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

Daca observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Păsări de colivie și volieră (porumbei voiajori și de ornament, păuni, fazani, canari, papagali, sticleți), câini și pisici.

8. DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

OXIFURAN VITAMINIZAT se administrează pe cale orală, încorporat în hrană în doză de:

- 0,5 - 0,6 g/kg de hrană la puii păsărilor de colivie și volieră, timp de 2-4 săptămâni.
- 1-1,5 g/kg de hrană la câini și pisici la înțarcare, timp de 10 zile.
- 0,3 - 0,5 g/kg de hrană la câini și pisici după înțarcare, timp de 2-5 săptămâni.

9. RECOMANDAȘI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se recomandă o omogenizare bună a produsului cu hrana.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C, în ambalajul original.

A nu se folosi după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 60 zile.

Perioada de valabilitate după încorporare în hrană: a se utiliza imediat.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE**Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă**

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate.

Daca acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor izolate.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din SPC poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la oxitetraciclină și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene ca urmare a rezistenței încrucișate.

Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează produsul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingerare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta.

Utilizare în perioada de gestație și lactație sau în perioada de ouat

Utilizarea în perioada de gestație: a nu se utiliza în ultima parte a gestației.

Utilizarea în perioada de lactație: se va face pe baza evaluării balanței risc-beneficiu de către medicul veterinar.

Utilizarea în perioada de ouat: nu este aplicabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Produsul nu trebuie administrat simultan cu antiacide pe bază de aluminiu sau cu preparate ce conțin Ca, Mg sau Fe, datorită apariției reacțiilor de chelatare cu tetraciclinile.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)

În cazul intoxicației acute, trebuie inițiată terapia simptomatică și măsurile generale de susținere a animalului.

Incompatibilități

Nu se cunosc.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medical veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATA CÂND A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

Octombrie 2015

15. ALTE INFORMAȚII

Mod de prezentare: pungi din folie laminata PET/MET x 50 g, x 100 g și 1000 g.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.