

## Epilease®

Cel mai sigur mod de tratate pe termen lung a epilepsiei

În ultimii anii utilizarea bromurii de potasiu pentru tratamentul Epilepsiei, a câștigat aprobarea medicilor veterinari. Este în mod particular benefic pentru câini care prezintă un răspuns slab la fenobarbitonă, câini cu boli la ficat, toxicitate hepatică ca rezultat al utilizării fenobarbitonicelor.

### Compoziție

Stearat de magneziu, Celuloză microcristalină.

Aditivi

Bromură de potasiu 869115 mg/kg.

### Indicații

Capsula poate fi administrată ca atare sau poate fi deschisă, amestecând conținutul său cu hrana. A nu se administra pe stomacul gol.

A se administra ămprună cu mesele regulate

### Protocolul de administrare a dozei de încărcare

Se administrează o doză totală de 120mg/kg/zi+ doza de întreținere, administrate în patru reprize pe zi.

Doza stabilă la nivel sanguine va fi atinsă după 5 zile de administrare.

Se continuă cu doza de întreținere începând cu ziua 6.

Se pot observa efecte secundare cum ar fi modificări comportamentale și/sau ataxia.

Se recomandă supraveghere medicală pe parcursul administrării dozei de încărcare-pentru evitarea supradozării și apariția stării de toxicitate.

### Doza de întreținere:

Administrat cu fenobarbital 25 -40mg/kg/zi

Administrat ca agent terapeutic unic 50 -80mg/kg/zi

Niveluri serice stabile se obțin după 4 luni de administrare.

După o lună de administrare procentul de stabilitate este de 60% ceea ce permite ajustarea dozei. Reducerea treptată a fenobarbitalului se poate face la două luni după terapia continuă cu Epilease. În mod obișnuit se recomandă o singură administrare zilnică.

Dacă apar tulburări Gastro Intestinale (e.g. vomă) doza va fi administrată în două reprize.

### Atenționare

Numai pentru uz veterinar.

### Depozitare

15°C - 25°C. A se feri de lumina directă a soarelui.

### Producător

VetPlus Ltd, Docklands, Dock Road, Lytham, FY8 5AQ, UK.