

# Fiprex 75 Spot On Pentru Câini

## Compoziție

Fipronil 7,5 g,  
Vehicul qs ad 100 ml.

## Forma farmaceutică

Soluție spot-on.

## Proprietăți

Fipronil este un insecticid/acaricid din familia fenilpirazolului. Acționează prin inhibarea complexului GABA, legând canalele de clor și blocând transferul pre- și postsinaptic al ionilor de clor de-a lungul membranei. Aceasta determină o activitate necontrolată a sistemului nervos central și moartea insectei.

Fipronil are acțiune insecticidă și acaricidă împotriva puricilor (*Ctenocephalides* spp.), căpușelor (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp. și *Ixodes* spp.) inclusiv *Ixodes ricinus*, cu importanță epizootică, fiind agentul de transmitere al bolii lui Lyme, și păduchi (*Trichodectes canis*) la câini.

FIPREX 75 SPOT ON PENTRU CAINI este eficient în infestațiile cu purici pentru aproximativ 2 luni și în infestațiile cu căpușe pentru aproximativ 1 lună, în funcție de modificările de mediu. Puricii noi care apar pe corpul animalului tratat, mor în 24 ore.

## Speciile țintă

Câinii.

## Indicații

Produsul este eficient în infestațiile cu păduchi la câini: *Trichodectes canis*, *Ctenocephalides* spp, *Rhipicephalus* spp. *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp. inclusiv *Ixodes ricinus*,

## Contraindicații, atenționări, etc.

În absența altor date, produsul nu trebuie utilizat la cățeei sub 8 săptămâni (și/sau sub greutatea de 2 kg). Acest produs este special destinat pentru câini.

Nu utilizați pentru deparazitarea pisicilor, întrucât se pot produce supradozări.

## Efecte secundare

Dacă câinii se ling, se poate observa o hipersalivație de scurtă durată, datorită vehiculului din produs.

Evitați supradozarea.

## Precauții speciale pentru utilizare

Numai pentru uz extern.

Este important ca produsul să se aplice în regiunile unde animalele nu se pot linge, și să ne asigurăm că nu se vor linge nici între ele consecutiv tratamentului.

Întrucât nu există studii privind efectele produsului, se vor evita îmbăierile cu două zile înainte și după aplicarea sa, precum și îmbăierile mai dese decât o dată pe săptămână.

## Utilizarea produsului în timpul gestației și al lactației

Acest produs se poate folosi și în timpul gestației și al lactației.

## Doza și calea de administrare

Prin aplicații locale pe piele.

## Dozare:

1 tub de 1 ml (conținând 75 mg de fipronil) per câine în greutate de până la 10 kg – tub marcat cu mărimea S.

1 tub de 2 ml (conținând 150 mg de fipronil) per câine în greutate de peste 10 kg și până la 20 kg – tub marcat cu mărimea M.

1 tub de 4 ml (conținând 300 mg de fipronil) per câine în greutate de peste 20 kg și până la 40 kg – tub marcat cu mărimea L.

1 tub de 5,5 ml (conținând 412,5 mg de fipronil) per câine în greutate de peste 40 kg și până la 60 kg – tub marcat cu mărimea XL.

Pentru câini de peste 60 kg utilizați două tuburi de mărimea XL.

## Metoda administrării:

Țineți aplicatorul vertical. Scuturați, pentru a vă asigura că produsul este în partea sa inferioară. Deschideți tubul prin răsucirea capacului. Îndepărtați părul din regiunea interscapulară până ce pielea devine vizibilă. Orientați capătul tubului pe piele și goliți cu atenție conținutul în una sau două puncte.

## Supradozarea

Riscul efectelor secundare este totuși posibil în cazul în care se crește doza recomandată, astfel, animalele trebuie tratate întotdeauna cu tipul de tub corespunzător taliei.

## Atenționări speciale pentru animalele țintă

Evitați contactul produsului cu ochii animalelor.

## Timp de așteptare

Nu este cazul.

## Precauții speciale pentru persoanele care administrează produsul animalelor

Acest produs poate determina iritații ale mucoaselor și ale ochilor. Așadar, se va evita contactul produsului cu gura și cu ochii.

Animalele și persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la insecticide, trebuie să evite contactul cu FIPREX 75 SPOT ON PENTRU CÂINI. Evitați contactul produsului cu degetele. Dacă acest lucru se întâmplă, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.

După expunerea accidentală a ochilor, aceștia trebuie spălați imediat cu apă din abundență.

Spalati-vă pe mâini după utilizare. În timpul utilizării, este interzis fumatul, mâncatul și băutul.

Animalele tratate nu trebuie manipulate până la uscarea completă a lor, iar copii trebuie feriți de acestea până la uscarea completă a produsului pe animale.

**Incompatibilități**

Nu se cunosc.

**Valabilitate**

2 ani de la data fabricației.

**Păstrare**

Păstrați în ambalajul original într-un loc uscat. Nu păstrați la temperaturi de peste 25°C.

**Condiții speciale pentru manipularea deșeurilor**

Fipronil poate afecta organismele acvatice. Nu contaminați iazurile, conductele de apă sau canalizările aruncând containerul gol.

Orice deșeu rezultat, trebuie manipulat conform reglementărilor naționale în vigoare.

**Producător**

**Vet-Agro Sp. z o.o.**

Phone: +48 81 525 27 11

Fax: + 48 81 5382396

[www.vet-agro.pl](http://www.vet-agro.pl)

**Alte informatii**

FIPREX 75 SPOT ON PENTRU CÂINI – nu previne infestarea animalelor cu căpușe, dar acestea vor fi omorâte în primele 24-48 ore de la tratament, astfel că se minimizează riscul transmiterii bolilor hematofage. După ce mor, căpușele cad de pe corpul animalului, iar dacă persistă, se pot desprinde cu ușurință.

După aplicarea sa pe o regiune, produsul pătrunde pe tot corpul animalului în 24 ore. După aplicare, absorbția fipronil prin piele este slabă.

Îmbăierea sau șamponarea animalului până la o oră de la momentul aplicării, nu afectează eficacitatea produsului.