

## Ratimor Brodifacoum Fresh Bait

**Momeala gata de utilizare [în plicuri dacă momeala este neagregată] în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării.**

### 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Unichem d.o.o.

Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenia

### 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL V ETERINAR

Ratimor Brodifacoum Fresh Bait

Ratimor Brodifacoum pastă proaspătă

Glodacid plus pastă proaspătă

Brodifacoum pastă proaspătă

### 3. DECLARAAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)

**Substanță activă:**

Brodifacum 0.0029%

### 4. INSTRUCȚIUNI PENTRU FIECARE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării. Înainte de a utiliza produse rodenticide, luați în considerare eventualele metode de combatere nechimice (de exemplu, curse). Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale sărate sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curătați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii. Capcanele trebuie să fie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.). Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri. [Nu deschideți plicurile care conțin momeala – atunci când este necesar din cauza formulei produsului]. Amplasați capcanele în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizate. Amplasați capcanele la distanță de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea. Nu amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, unde pot intra în contact cu apa. Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă. Îndepărtați momeala rămasă sau capcanele la sfârșitul perioadei de tratament.

Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrână și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

Nu utilizați rodenticide anticoagulante ca momeli permanente (de exemplu, pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a detecta prezența rozătoarelor).

A se utiliza exclusiv în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării. Capcanele trebuie să fie etichetate conform recomandărilor privind produsul.

Acest produs ar trebui să elimine rozătoarele într-o perioadă de 35 de zile. Este recomandat utilizatorului să contacteze furnizorul produsului sau un serviciu de deratizare în cazul în care există suspiciuni de ineficiență a produsului la sfârșitul perioadei de tratament (se observă în continuare prezența rozătoarelor).

Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte pe durata tratamentului, cel puțin la fiecare verificare a capcanelor. Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale. Eliminarea se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați.

**Metoda și/sau frecvența de aplicare: La interior (Șoarecele de casă)**

Șoareci: infestare puternică – 10 g până la 20g momeală în stații de intoxicare sau puncte momeală acoperite la fiecare 2m. Infestare ușoară – 10 g până la 20g momeală în stații de intoxicare sau puncte momeală acoperite la fiecare 5m.

Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

**Metoda și/sau frecvența de aplicare: La interior (Şobolanul brun și Şobolanul negru)**

Şobolani: infestare puternică – 10 g până la 60g momeală în stații de intoxicare la fiecare 5m. Infestare ușoară – 10 g până la 60g momeală în stații de intoxicare la fiecare 10m.

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

**Metoda și/sau frecvența de aplicare: La exterior, în jurul clădirilor (Şobolanul brun și Şobolanul negru)**

Şobolani: infestare puternică – 10 g până la 60g momeală în stații de intoxicare la fiecare 5m. Infestare ușoară – 10 g până la 60g momeală în stații de intoxicare la fiecare 10m.

Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare. Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor. Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

**5. INSTRUCȚIUNI DE PRIM-AJUTOR**

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sânge în urină și gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină. Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar. În caz de: - expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun; - expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute; - expunere orală, clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului [...]. Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie [...]. Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „denumirea produsului sau numărul de autorizație”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică [...]”. Periculos pentru animalele sălbatice.

Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați. Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.

**6. ELIMINAREA**

La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Momelile se vor îndepărta după încheierea tratamentului, urmând să fie eliminate conform legislației în vigoare. Eliminarea se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid. Se recomandă utilizarea de mănuși.

**7. DEPOZITARE**

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui. A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.

**8. PERIOADĂ DE VALABILITATE**

2 ani.