

Karsivan 50

comprimate pentru câini

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITEDeținătorul autorizației de comercializare:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1A, 85716 Unterschleissheim
Germania

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Karsivan 50, comprimate pentru câini
Propentofilină

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

1 comprimate conține 50 mg propentofilină

- lactoza monohidrata
- amidon de porumb
- crospovidona
- talc
- stearat de magneziu
- siliciu coloidal anhidru
- hipromeloza
- dioxid de titaniu
- oxid galben feric
- macrogol 8000

INDICAȚII

Îmbunătățirea circulației la nivel cerebral și periferic

CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la cățelele gestante sau la cățelele pentru reproducere.

REAȚII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Câini

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza zilnică totală este de 6-10 mg propentofilină per kg greutate corporală, divizată în 2 administrări (3-5 mg/kg greutate corporală de două ori pe zi) și se va administra după cum urmează:

Greutatea corporală a câinelui [kg]	Comprimate		Doză unică [mg/kg greutate corporală]	Comprimate Total zilnic	Doza zilnică totală [mg/kg greutate corporală]
	am	pm			
< 5	¼	¼	2.6 – 5.0	½	5.1 – 10.0
5-8	½	½	3.1 – 5.0	1	6.3 – 10.0
9-15	1	1	3.3 – 5.5	2	6.7 – 11.1
16-25	1 ½	1 ½	3.0 – 4.7	3	6.0 – 9.4
26-32	2	2	3.1 – 3.9	4	6.3 – 7.7
33-50	2 ½	2 ½	3.0 – 4.6	5	6.0 – 9.1

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Comprimatele filmate pot fi administrate direct sau incorporate cu hrana. Preferabil comprimatele se vor administra cu 30 minute înainte de masa.

TIMP DE AȘTEPTARE

Nu se aplică.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de temperatură pentru depozitare.

Se va păstra în ambalajul original pentru a-l proteja de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe eticheta

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale

ALTE INFORMAȚII**Proprietăți farmacodinamice**

Propentofilina aparține derivaților xantinderivați. Sunt disponibile date privind siguranța și eficacitatea care demonstrează că propentofilina crește fluxul sanguin la nivel cerebral, cardiac și muscular. De asemenea inhibă agregarea plachetară și îmbunătățește proprietățile circulante ale eritrocitelor.

Particularități farmacocinetice

După administrarea orală, propentofilina este repede și complet absorbită și distribuită în țesuturi. După administrarea orală la câini, nivelele maxime plasmatică se regăsesc deja după 15 minute de la administrare.

Timpul de înjumătățire este de aproximativ 30 de minute și biodisponibilitatea pentru substanța activă se ridică la 30%. Acesta este numărul metabolizilor eficienți și biotransformarea are loc preponderent în ficat. Propentofilina este excretată sub forma de metaboliți în proporție de 80 - 90 % pe cale renală. Restul este eliminat prin fecale. Nu există acumulări în organism.

Cutie de carton ce conține două blistere a câte 30 comprimate și cutie de carton cu un blister cu 30 comprimate

Nu toate prezentările pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L., ILFOV,

Șos. De Centură Nr.25 – 27, Com. Chiajna

Tel: 021.311.83.11/12/; Fax: 021.311.83.17