

## Narcoxyl® 2

**Sedativ, anestezic, analgezic și relaxant muscular.**

### Descriere

**Narcoxyl® 2** se prezintă sub forma unui flacon ce conține o soluție injectabilă, apoasă, transparentă.

### Compoziție

1 ml conține 20 mg xilazină hidroclorică.

### Indicații

Sedativ pentru: radiografii, potcovit, transport; analgezic pentru intervenții dureroase, (tratamente și chirurgie dentară), chirurgia rănilor ușoare, castrare, și aplicarea inelelor nazale; relaxant muscular în chirurgie și anestezie în combinație cu ketamina.

### Mod de acțiune

Xilazina hidroclorică acționează ca sedativ, anestezic, analgezic și miorelaxant. Tipul și intensitatea răspunsului sunt în funcție de specie și doză.

### Doze și mod de administrare

Se folosește ca sedativ, premedicație, în combinație cu ketamina, l-polamidon, butofanol.

#### A. Xilazina în combinație cu anestezice

<i>Specia</i>	<i>Mod de administrare</i>	<i>Narcoxyl (ml)</i>	<i>Xilazină (ml) mg/kg g.v.</i>
Cabaline	i.v. i.m.	2-5 ml/100 kg g.v. 7,5-15 ml/100 kg g.v.	0,4-1 mg/kg g.v. 1,5-3 mg/kg g.v.
Canide	i.v., i.m.	0,5-1,5 ml/10 kg g.v.	1-3 mg/kg g.v.
Feline	i.m.	0.05-0,1 ml/ kg g.v.	1-2 mg/kg g.v.
Suine	i.m.	0,1-0,2 ml/ kg g.v.	2-4 mg/ kg g.v.
Leporide	i.m.	0,2-0,25 ml/kg g.v.	4-5 mg/ kg g.v.
Porc de Guinea, hamster	i.m.	0,2-0,25 ml/ kg g.v.	4-5 mg/ kg g.v.
Animale sălbatice	i.m.	0,0025-0,5 ml/ kg g.v.	0,05-10 mg/ kg g.v.

#### B. Xilazina simplă

<i>Specia</i>	<i>Mod de administrare</i>	<i>Narcoxyl (ml)</i>	<i>Xilazină (ml) mg/kg g.v.</i>
Pisică	i.m.	0,1-0,2 ml/ kg g.v.	2-4 mg/ kg g.v.
Vacă	i.v.	Doza I 0,08-0,12ml/100 kg g.v.	16-24μg/ kg g.v.
		Doza II 0,17- 0,25ml/100 kg g.v.	34-50μg/ kg g.v.
		Doza III 0,33-0,50 ml/ 100 kg g.v.	66-100μg/ kg g.v.
	i.m.	Doza I 0,25 ml/ 100 kg g.v.	50μg/ kg g.v.
		Doza II 0,50 ml/100 kg g.v.	100μg/ kg g.v.
		Doza III 1,0 ml/ 100 kg g.v.	200μg/ kg g.v.
		Doza IV 1,5 ml/ 100 kg g.v.	300μg/ kg g.v.
Oaie și capră	i.m.	0,05-0,25ml / 10 kg g.v.	0,1-0,5 mg/kg g.v.

Doza I: sedare și analgezie pentru intervenții minore.

Doza II: sedare moderată, analgezie și relaxare musculară pentru proceduri chirurgicale minore.

Doza III: sedare profundă, analgezie și relaxare musculară puternică pentru proceduri chirurgicale majore.

Doza IV: rezervată pentru cazuri speciale; numai administrare i.m.

**Contraindicații**

Nu se folosește la vacile în ultimul trimestru de gestație; poate provoca avort. Nu se folosește la animalele cu torsiune gastrică sau obstrucție esofagiană.

**Efecte adverse**

Avort în ultima perioadă a gestației la vaci, depresia ritmului cardiac și respirator, vomă la câine și pisică și timpanism la rumegătoare.

**Precauții**

La cai poate produce bradicardie accentuată, în acest caz se recomandă injectarea de atropină (1 mg/100 kg g.v) i.m. sau i.v.

**Supradozare**

Se va evita supradozarea, în caz de supradozare, antidot: alfa2-antagoniști ca doxapram, yohimbina, tolazolină, 4-aminopiridină.

**Perioadă de așteptare**

Lapte și carne: 24 ore.

**Păstrare**

La temperatura camerei (15-25°C) și la întuneric.

**Prezentare**

Flacoane de 20 și 50 ml.

**Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje**

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.