

## Nobilis® SG 9R

### Vaccin contra infecțiilor cu *S. gallinarum* și *S. enteritidis* la păsări.

#### Descriere

**Nobilis® SG 9R** se prezintă sub forma unui flacon ce conține o pastilă liofilizată de culoare alb-gălbui, însoțit de un flacon cu diluant pentru reconstituire.

#### Compoziție

Fiecare doză conține cel puțin  $2 \times 10^7$  CFU (unități formatoare de colonii) de *Salmonella gallinarum* tulpina 9R.

#### Indicații

Imunizarea activă a puilor contra infecțiilor cu *S. gallinarum* (tifoza aviară) și *S. enteritidis*.

#### Mod de acțiune

Tulpina 9R protejează tineretul de înlocuire față de infecțiile cu *S. gallinarum* (tifoza aviară) și de *S. enteritidis*.

#### Doze și mod de administrare

Fiecare pasăre se injectează subcutanat (în treimea postero - inferioară dorsală a gâtului) cu 0,2 ml vaccin reconstituit. Pentru reconstituirea vaccinului se folosește Nobilis® FD diluant.

**Reconstituirea vaccinului:** în flaconul cu pastila liofilizată se adaugă 2 ml diluant; se extrage amestecul existent cu seringă și se introduce într-un flacon cu diluant; flaconul cu vaccin se clătește de 3 ori cu diluant și se adaugă la amestecul vaccinal. Pentru reconstituirea unui flacon de 500 dz. este necesară o cantitate de 100 ml diluant.

#### Program de vaccinare:

Prima vaccinare: la vârsta de 6 săptămâni.

Revaccinarea: după 12 săptămâni (la transfer).

#### Contraindicații

Nu se vaccinează păsările bolnave.

#### Efecte adverse

Nu sunt.

#### Incompatibilități și interacțiuni

7 zile înainte și 14 zile după vaccinare nu se folosesc antibiotice, chimioterapice sau alte substanțe antibacteriene.

#### Precauții

Spălați și dezinfectați mâinile înainte și după vaccinare. Se va folosi echipament steril pentru vaccinare.

#### Perioada de așteptare

Carne: 0 zile.

Ouă: 0 zile.

#### Supradozare

La doze duble nu apar simptome clinice.

#### Păstrare

La temperatura de 2 - 8°C, la întuneric și ferit de îngheț.

#### Prezentare

Cutie cu 10 fl. x 1000 doze.

#### Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Flacoanele deschise și vaccinul reconstituit rămas neutilizat se inactivează prin fierbere sau se ard.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.