

Terramycin[®] / L.A.

T.M.L.A.**Soluție injectabilă.****Compoziție**

Oxytetracilină dihidrat	200 mg,
Excipient acțiune prelungită qsp	1 ml.

Proprietăți

Formula brevetată a TMLA permite printr-o singură injecție realizarea unei antibioterapii complete. După o singură injecție în doză de 1 ml/10kg greutate vie, titrurile sanguine eficiente se mențin timp de 3-5 zile. Administrarea unică de TMLA înlocuiește 3 administrări la 24 ore interval, cu un antibiotic cu formulă clasică. Spre deosebire de preparatele "retard" obișnuite, titrul sanguin apare foarte rapid după injecție, ceea ce permite utilizarea acestui produs și în cazul infecțiilor acute. Terramycina are un spectru larg de activitate acționând asupra germeilor Gram pozitivi, Gram negativi, *Actinomyces spp.*, protozoare, spirochete, mycoplasme și chlamidii.

Indicații

Se folosește în tratamentul unor infecții generale sau locale la bovine, ovine, caprine și porcine:

- Pneumopatii infecțioase, febra de transport;
- Gastroenterite infecțioase;
- Metrite, mamite, sindrom MMA (Mamită-Metrită-Agalaxie);
- Avorturi infecțioase (chlamydia, febra Q);
- Panarițiu, artrite;
- Anaplasmoză, leptospiroză, cărbune emfizematos, actinobaciloză;
- Prevenirea infecțiilor chirurgicale, traumatice sau obstetricale;
- Complicații bacteriene ale maladiilor virale;
- Patologie tropicală (anaplasmoză, dermatophiloză);
- Kerato-conjunctivite infecțioase la bovine;

Mod de administrare și doze

Se administrează pe cale intramusculară profundă prin injecție unică. Doza la bovine, ovine, caprine și porcine este de 1 ml/10kg greutate vie; la purcei în greutate de 2-10 kg se va face 1 ml subcutanat, iar la cei sub 2 kg doar 0,5 ml sc. A nu se administra în aceeași zi Fier injectabil. În cazurile ce necesită o antibioterapie prelungită, produsul poate fi readministrat la 3-5 zile după prima inoculare. Poate apărea o tumefacție pasageră la locul infecției, dar nu prezintă nici un caracter de gravitate și dispare în câteva zile. Pentru a diminua acest fenomen, se recomandă să nu se injecteze:

- peste 20 ml în același loc la bovine;
- peste 5 ml în același loc la ovine și caprine;
- peste 10 ml în același loc la porcine.

Perioada de așteptare

Carne și subproduse 21 zile.

Lapte 7 zile.

Condiții de conservare

Terramycina L.A. este stabilă și se păstrează la temperatura camerei (dar nu peste 30°C) și ferită de îngheț. Poate apărea o ușoară înnegrire a soluției, fapt ce nu îi reduce cu nimic eficacitatea.

Prezentare

Flacoane de 30 ml, 50 ml, 100 ml sau 250 ml.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !