

Heptavac[®]

Vaccin inactivat împotriva clostridiozelor la oi, scroafe gestante și porcei.

Descriere

Heptavac[®] se prezintă sub forma unui flacon ce conține un lichid opalescent.

Compoziție

Fiecare doză de vaccin conține tulpini de *Clostridium perfringens* tip B, C, D, *Clostridium septicum*, *Clostridium tetani*, *Clostridium novyi* tip B, *Clostridium chauvoei* și toxozii echivalenți (5 tulpini utilizate).

Indicații

La oi: pentru imunizarea activă împotriva enterotoxiemiilor anaerobe, distrofiilor renale, tetanosului, cărbunelui emfizematos, edemului malign și împotriva metritelor clostridice. Vaccinarea oilor gestante asigură transmiterea pasivă a imunității la miei împotriva dizenteriei anaerobe, distrofiilor renale și tetanosului, care pot persista timp de 12 săptămâni.

La scroafe: pentru imunizarea activă a scroafelor gestante împotriva hepatitei produse de **Clostridium novyi** și tetanosului precum și pentru asigurarea imunității pasive la porceii acestora împotriva dizenteriei anaerobe produse de *Clostridium perfringens* tip C și a tetanosului.

Mod de acțiune

Imunizează activ oile și scroafele gestante (porceii) pe calea imunității pasive față de infecțiile clostridiene.

Doze și mod de administrare

Administrare pe cale subcutanată în partea laterală a porțiunii superioare a gâtului.

Oi: pentru cele nevaccinate se recomandă două administrări de câte 2 ml vaccin la interval de 4 - 6 săptămâni, urmat de rapel anual. La oile gestante se administrează cu 4 - 6 săptămâni înainte de fătare pentru a permite transmiterea imunității pasive prin colostru la miei. Miei născuți din oi vaccinate își vor păstra imunitatea pentru câteva săptămâni după fătare. Dacă vor beneficia de cantități adecvate de colostru în primele 12 ore după fătare, atunci imunitatea pasivă împotriva clostridiozelor se va menține timp de 12 săptămâni. Miei destinați reproducției sau pentru îngrășare se vor vaccina de 2 ori cu câte 2 ml, la interval de 4 - 6 săptămâni, urmate de rapel anual. În zonele cu risc de infecție se recomandă o administrare de 2 ml cu 2 - 3 săptămâni înainte de perioada de risc identificată.

Scroafe: două administrări de câte 5 ml la interval de 3 săptămâni, cea de a doua cu cel puțin 3 săptămâni înainte de fătare. În continuare, pentru fătările ulterioare este necesară o singură vaccinare la cel puțin 3 săptămâni înainte de fătare.

Contraindicații

Nu se vaccinează mieii mai mici de 3 săptămâni.

Efecte adverse

La locul de inoculare poate să apară un nodul temporar. Ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate.

Incompatibilități și interacțiuni

Nu sunt.

Precauții

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei. Flaconul se agită pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

Perioada de așteptare

Carne: 0 zile.

Lapte: 0 zile.

Supradozare

La doze multiple nu apar simptome clinice.

Păstrare

La temperatura de 2-8°C, la întuneric și ferit de îngheț.

Prezentare

Flacon de 250 ml.

Precauții pt. produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.

Numai pentru uz veterinar.