

Porcilis M Hyo

Vaccin bacterian inactivat

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Olanda

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Porcilis M Hyo, suspensie injectabilă
Vaccin bacterian inactivat

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Per doză de 2 ml:

Concentrat celular inactivat de *Mycoplasma hyopneumoniae tulpina 11*: $\geq 7.0 \log_2$ titruAb
150 mg acetat de dl- α -tocoferil
Acetat de dl- α -tocoferil
Polisorbat 80
Simethicone
Clorură de sodiu
Fosfat dihidrogen de sodiu
Disodiu hidrogen fosfat
Apă pentru injecție

INDICAȚII

Pentru porcii destinați îngrășării
Pentru imunizarea activă a porcilor, pentru a reduce leziunile pulmonare cauzate de infecția cu *Mycoplasma hyopneumoniae*.
Debutul imunității: 2 săptămâni după vaccinarea secundară
Durata imunității: cel puțin 20 de săptămâni după vaccinarea secundară .

CONTRAINDICAȚII

Nu există

REAȚII ADVERSE

În prima sau a doua zi după vaccinare poate apărea la porci o creștere tranzitorie, redusă a temperaturii corporale de aproximativ 0.3°C sau în cazuri individuale poate fi de până la 2.0°C. Animalele revin la starea normală în ziua următoare. La locul injecției poate apărea o umflătură/roșeață trecătoare (diametru max. 5 cm) care va dispărea într-o perioadă de maxim 14 zile.
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Porci destinați îngrășării

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

La porci, administrare intramusculară de 2 ml per animal, în gât, în zona din spatele urechii.

Schema de vaccinare:

Vaccinați porcii de două ori, la un interval de trei săptămâni. Primul vaccin poate fi administrat începând de la vârsta de o săptămână.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de a administra vaccinul, lăsați flaconul să ajungă la temperatura camerei (15-25°C) și agitați-l bine.
Folosiți seringi și ace sterile.
Evitați contaminarea.

TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: folosiți imediat

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C)

A se feri de îngheț

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Vaccinați numai animalele sănătoase.

În caz de auto-injecție accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

A nu se amesteca cu nici un alt vaccin sau produs imunologic, cu excepția vaccinului viu Porcilis PRRS al Intervet, la porci începând cu vârsta de 4 săptămâni.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale

ALTE INFORMAȚII

Cutii din carton cu 1 flacon PET de 20, 50, 100, 200 sau 250 ml, 5 flacoane PET de 20, 50, 100, 200 sau 250 ml sau 10 flacoane PET de 20, 50, 100, 200 or 250 ml. Flacoanele sunt închise cu dopuri halogenate din cauciuc halogenobutitic și sunt sigilate cu un capac din aluminiu. Nu pot fi comercializate ambalaje de toate dimensiunile.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L.,

Șos. de Centură Nr. 27-28,

Telephone number: 0721288803

Fax number: 0213118317