

Synulox[®] L.C.

(Lactating Cow) Suspensie intramamară.

Compoziție

Acid clavulanic (clavulanat de potasiu)	50 mg,
Amoxicilină trihidrat PhEur	200 mg,
Prednisolon PhEur	10 mg,
Exipienți qsp	3 g.

Proprietăți

Are un spectru larg de activitate, acționând asupra germeilor izolați în mod obișnuit în glanda mamară la bovine (streptococi, stafilococi, *Corynebacterium* și *Escherichia coli*) precum și asupra unor germeni mai rar întâlniți (*Bacillus cereus*, *Bacteroides spp*, *Camphylobacter spp*, *Klebsiela* și *Pasteurele*). Rezistența la numeroasele antibiotice este cauzată de ezimele β -lactamaze ce inactivează antibioticul înainte ca acesta să acționeze asupra bacteriilor. Acidul clavulanic blochează acest mecanism de apărare, inactivând β -lactamazele, astfel încât germenii devin sensibili la efectul bactericid al amoxicilinei. Prednisolonul are acțiune antiinflamatorie, ceea ce ajută la reducerea edemului și inflamației locale consecutive mamei, fără a afecta răspunsul imun.

Indicații

Se folosește în tratamentul mamitelor la bovine, produse de germenii Gram pozitivi și Gram negativi.

Mod de administrare și doze

Se administrează intramamar după mulsul complet și dezinfecția mamelonului cu alcool.

Doza: 3 seringi pentru un sfert afectat, câte o seringă la fiecare 12 ore.

Contraindicații și precauții

Laptele obținut în timpul tratamentului nu se administrează pentru consumul uman.

Perioada de așteptare

Lapte: 48 ore.

Carne: 7 zile.

Condiții de conservare

Spații răcoroase.

Prezentare

Seringi de 4,5 ml.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !