

## Rimadyl Soluție injectabilă, 50 mg/ml pentru câini și pisici

**NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SĂRIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare:

**Pfizer Animal Health MA EEIG**  
Ramsgate Road  
Sandwich,  
Kent CT13 9NJ  
Marea Britanie

Producător pentru eliberarea seriei:

**Pfizer Animal Health SA**  
1, rue Laid Burniat  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgia

### DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Rimadyl Soluție injectabilă, 50 mg/ml pentru câini și pisici.

### DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Substanța activă:

Carprofen 50.0 mg/ml

Excipient:

Alcool benzilic 10.0 mg/ml

### INDICAȚII

**Câini:** Pentru controlul durerii post-operatorii și al inflamației ce apare după intervențiile chirurgicale la nivelul aparatului locomotor și la nivelul țesuturilor moi (inclusiv intervențiile chirurgicale intraoculare).

**Pisică:** Pentru controlul durerii post-operatorii ce însoțește intervențiile chirurgicale.

### CONTRAINDICAȚII

Nu se va administra prin injecții intramusculare.

Nu se va depăși doza recomandată sau durata tratamentului.

Nu se va administra la animalele cu afecțiuni cardiace, hepatice sau renale la care există posibilitatea apariției ulcerărilor gastro-intestinale sau sângerărilor sau la care există riscul de discrie sangvină sau de hipersensibilitate față de produs. Ca și alte medicamente antiinflamatorii nesteroidine există riscul unor rare reacții adverse, de natură renală sau de idiosincrazie hepatică.

Nu se va administra împreună cu alte antiinflamatorii nesteroidiene sau la un interval mai mic de 24 de ore între ele. Unele antiinflamatorii nesteroidiene pot fi cuplate într-un procent ridicat de proteinele plasmatice și să intre în competiție cu alte medicamente cu aceeași caracteristică, ceea ce poate determina apariția de efecte toxice.

### REAȚII ADVERSE

Nu există.

### SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

### POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

**Câini:** Doza recomandată este de 4 mg/kg g.v. (1 ml/12,5 kg g.v.) pe cale intravenoasă sau subcutanată. Rimadyl injectabil are efecte mult mai bune dacă se administrează pre-operator, fie în timpul premedicației sau al inducerii anesteziei.

Pentru a extinde efectul analgezic și antiinflamator post-operator, terapia parenterală poate fi urmată de administrarea de Rimadyl tablete la doza de 4 mg/kg/zi până la 5 zile de tratament.

**Pisici:** Doza recomandată este de 4 mg/kg g.v. (0,24ml/3 kg g.v.) pe cale intravenoasă sau subcutanată, recomandat este să se administreze pre-operator în momentul inducerii anesteziei. La pisică, datorită perioadei mari de înjumătățire, și a indicelui terapeutic limitat, trebuie avut grijă să nu se depășească sau să se repete (dubleze) doza recomandată. Se recomandă utilizarea unei seringi gradate cu capacitatea de 1 ml pentru acuratețea dozării.

Studiile clinice efectuate la câini și pisici au sugerat ca este necesară numai o doză de carprofen în primele 24 de ore postoperator; dacă sunt necesare analgezice în această perioadă, dacă este necesar, se poate administra o jumătate de doză de carprofen la câini (nu și la pisici).

### RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nici una.

### TIMP DE AȘTEPTARE

Nu se aplică.

**PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

Se va depozita la frigider la temperatura de 2<sup>o</sup> – 8<sup>o</sup> C. Nu se va congela.

Odată desigilat, produsul este stabil și poate fi utilizat la temperaturi de până la 25<sup>o</sup> C pentru o perioadă de 28 de zile.

După extragerea primei doze, produsul trebuie utilizat într-o perioadă de 28 de zile.

Materialele neutilizate se vor distruge.

**ATENȚIONARE SPECIALĂ**

Nu exista.

**PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**ALTE INFORMAȚII**

Rimadyl Injection se prezintă ca flacon de sticlă de culoarea chilimbarului de 20 ml, multidoză (tip I) sigilat cu dop de cauciuc bromobutilic, gri, cu capsă pliată de aluminiu.

Cutie cu 1 flacon x 20 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

**Pfizer România SRL**

Willbrook Platinum Business & Convention Center  
Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 172-176, Corp B, Etaj 5,  
Sector 1, 013686, Bucuresti  
Tel: + 40 21 207 28 00  
Fax: + 40 21 207 28 03