

## Synulox<sup>®</sup> Tablete Palatabile

### Compoziție

Tablete 50mg

40 mg Amoxicilină + 10 mg Acid clavulanic;

Tablete 250mg

200 mg Amoxicilină + 50 mg Acid clavulanic.

### Proprietăți

**SYNULOX Tablete Palatabile** prezintă un spectru larg al activității bactericide față de bacteriile comune întâlnite la câini și pisici. Rezistența la multe antibiotice este produsă de β-lactamaze, enzime ce inactivează antibioticul înainte ca el să poată acționa asupra bacteriilor. Acidul clavulanic din **SYNULOX Tablete Palatabile** neutralizează acest mecanism de apărare al bacteriilor inactivând β-lactamaza, iar microorganismele devin sensibile la efectul bactericid rapid al amoxicilinei, în concentrații ușor de atins în organism. Acționează față de o gamă largă de bacterii, ca:

- *Staphylococcus spp.* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze); *Escherichia coli* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze); *Salmonella spp.* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze); *Pasteurella spp.* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze); *Bacteroides* (inclusiv tulpinile producătoare de beta-lactamaze); *Haemophilus spp.*; *Bordetella bronchiseptica*; *Camphylobacter spp.*; *Klebsiela*; *Proteus spp.*; *Streptococi*; *Corynebacterium spp.*; *Clostridium spp.*; *Fusobacterium necrophorum*.

### Indicații

Din punct de vedere clinic, **SYNULOX Tablete Palatabile** a fost indicat ca fiind eficient în tratarea unei game largi de boli la câini și pisici, ca:

- boli de piele (în piodermite profunde și superficiale);
- infecții genito-urinare;
- boli respiratorii (infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare);
- enterite;
- infecții ale cavității bucale;
- infecții ale țesuturilor moi;
- infecții osteo-articulare.

### Mod de administrare și doze

Administrarea se face pe cale orală. Doza 12,5 mg/kg greutate vie.

Frecvența dozării – după următorul tabel:

Greutate (kg)	Nr. de tablete/doza de 2 ori/zi	
	50 mg	250 mg
1-3	½	-
3-5	1	-
6/9	2	-
10-13	3	-
14-18	4	-
19-25	-	1
26-35	-	1½
36-49	-	2
50	-	3

În cazurile refractare, mai ales de infecții ale căilor respiratorii, se dublează doza la 25 mg/kg greutate vie, de 2 ori pe zi.

Durata terapiei:

- cazurile de rutină în toate bolile indicate – terapie: 5 - 7 zile;
- cazurile cronice sau refractare - sunt sugerate următoarele durate de tratament;
- boli de piele cronice: 10 - 20 zile;
- cistite cronice: 10 - 28 zile;
- boli respiratorii: 8 - 10 zile.

### Contraindicații și precauții

Nu se administrează la iepuri, cobai și hamsteri. A se folosi cu precauție la orice alt ierbivor mic.

### Condiții de conservare

Se va păstra într-un loc răcoros și uscat.

### Prezentare

Tabletele de 50 mg sunt livrate în folii cu câte 10 comprimate în pachete de 100 și 500 bucăți, iar cele de 250 mg în folii de câte 10 comprimate în pachete de 100 și 250 bucăți.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !