

TELDOR® 500 SC

TELDOR® 500 SC – fungicid de contact și parțial sistemic pentru combaterea **putregaiurilor și moniliozelor** în culturile adulte de **viță de vie, pomi fructiferi** (cireș, vișin, prun), **căpșuni, legume** (tomate, castraveți, ceapă) și **flori** (lalele, crizanteme, garoafe).

Produsul se fixează puternic la suprafața organelor tratate ale plantei, formând un strat protector activ în locul de atac al ciupercii!!!

- **Cultură de viță-de-vie** – se diluează 8 ml în 8-10 l apă și se stropește de cel puțin 3 ori pe an, în următoarele faze: scuturarea florilor, înaintea compactării ciorchinului și la intrarea în pârg; în caz de infecție majoră se dublează doza de produs iar tratamentul trebuie să fie precedat de un desfrunzit masiv;

Timp de pauză: 7 zile

- **Pomi fructiferi** – se diluează 8 ml în 10 l de apă și se efectuează minim 2 tratamente anuale după scuturarea florilor și la intrarea în pârg; în caz de infecție majoră, doza se dublează;

Timp de pauză: 1-3 zile

- **Culturi de castraveți și tomate** – se diluează 8 ml în 10 l apă și se aplică foliar, direct pe plantă, la avertizare sau la apariția primelor simptome de boală începând cu apariția primului fruct (rod);

Timp de pauză: 1-3 zile

- **Culturi de căpșuni** – se diluează 16 ml în 10 l de apă și se aplică, imediat după înflorire, într-un volum de 1l/10 mp; tratamentul se repetă după fiecare recoltare a fructelor (de 2-3 ori pe sezon);

Timp de pauză: 1-3 zile

- **Flori (lalele, crizanteme, garoafe)** – se diluează 8 ml în 10 l de apă și se stropesc florile de 2-3 ori/sezon (4 l /100 mp).