

METROSEPT E

suspensie uleioasă pentru bovine, ovine, caprine, porcine

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

ROMVAC COMPANY S.A.
Șos. Centurii nr. 7
077190 Voluntari, jud. Ilfov
România

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

METROSEPT E, suspensie uleioasă pentru bovine, ovine, caprine, porcine.
Enrofloxacină, oxitetraciclină, iodoform

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

100 ml produs conține:

Substanțe active:

Enrofloxacină	2,5 g
Oxitetraciclină clorhidrat	5,0 g
Iodoform	5,0 g

4. INDICAȚII

METROSEPT E se recomandă pentru tratamentul metritelor, cervicitelor și vaginitelor la vaci, oi, capre, scroafe. Administrat după retenții placentare și fătări distocice, previne apariția infecțiilor.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active.

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Vaci, oi, capre, scroafe.

8. DOZE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează intra vaginal sau intrauterin în următoarele doze:

- 30 - 40 ml/vacă, 2-3 administrări la interval de 24 ore.
- 10 - 15 ml/oaie, capră și scroafă, 2-3 administrări la interval de 24 ore.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de administrarea produsului se face o toaletă cu apă și săpun a organului genital extern afectat. Produsul se aplică intra vaginal sau intrauterin cu ajutorul seringilor dozatoare prevăzute cu furtun de polietilenă.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 28 zile

Lapte: 7 zile

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C, în ambalajul original.

A nu se utiliza după data de expirare menționată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

La utilizarea produsului trebuie să se țină cont de politicile oficiale și locale privind produsele anti microbiene.

Fluoroquinolonele trebuie rezervate tratamentului afecțiunilor clinice cu răspuns insuficient sau care să preconizează ca vor avea un răspuns insuficient la alte clase de anti microbiene.

Ori de câte ori este posibil fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării analizelor de susceptibilitate.

Utilizarea produsului care se abate de la instrucțiunile furnizate în RCP poate spori prevalența bacteriilor rezistente la fluoroquinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte quinolone datorită potențialului de rezistență încrucișată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de ingerare accidentală a produsului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate la unul dintre componentele produsului, trebuie să evite contactul cu acesta. La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție reprezentat de mănuși de cauciuc.

Utilizare in perioada de gestație si lactație

Nu se administrează în gestație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi)

Se vor respecta dozele recomandate.

Incompatibilități

În absenta studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie administrat concomitent cu alte produse medicinale veterinare.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor car mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului

14. DATA CÂND A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Mod de prezentare: flacoane din polietilenă de înaltă densitate cu 50 ml ,100 ml, 250 ml și 1000 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medical veterinar, vă rugăm să contactați reprezenta local al deținătorului autorizației de comercializare.