

TILODEM 50

**500 mg tilozină tartrat/g, pulbere hidrosolubilă, pentru suine și păsări
(pui carne, păsări de reproducție, găini ouă consum, tineret înlocuire)**

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

SC DELOS IMPEX '96 SRL, Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov; Tel: 0372.714.433, Fax: 0372.871.445.

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

TILODEM 50, 500 mg tilozină tartrat/g, pulbere hidrosolubilă, pentru suine și păsări (pui carne, păsări de reproducție, găini ouă consum, tineret înlocuire).

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

TILODEM 50 este o pulbere de culoare albă ce conține per 1 gram.

Tilozină tartrat	500 mg
Excipient (lactoză monohidrat) qs.ad	1 g

4. INDICAȚII

Tilodem 50-pulbere hidrosolubilă se utilizează atât pentru acțiune locală, cât și sistemică și reprezintă un antibiotic de intervenție atunci când au apărut tulpini microbiene penicilino-rezistente. Se recomandă să se utilizeze, la porci și păsări, în tratamentul infecțiilor primare sau secundare, locale sau sistemice produse de germeni sensibili la tilozină. Se recomandă să se utilizeze în tratamentul pneumoniei enzootice a porcului, dizenteriei cu *Serpulina*, bolii respiratorii cronice la păsări, enteritelor, bronhopneumoniilor, metritelor piodermitelor, infecțiilor urinare, mastitelor, artritelor, omfaloflebitelor, salpingitelor etc.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la tilozină sau alte macrolide.

6. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

7. SPECII ȚINTĂ

Suine, păsări (pui carne, păsări de reproducție, găini ouă consum, tineret înlocuire).

8. DOZE, MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

La păsări: se administrează per os, în doză de 30-40mg Tilodem 50-pulbere hidrosolubilă/kg greutate vie/zi, timp de 4-5 zile consecutiv

La păsări în apa de băut: se administrează 300-400g Tilodem 50-pulbere hidrosolubilă la 1000 litri apă. timp de 4-5 zile consecutiv.

La porci: se administrează per os, în doză de 25-30 mg Tilodem 50-pulbere hidrosolubilă/kg greutate vie/zi. timp de 5-7 zile consecutiv.

La porci în furaj: se administrează 300-400g Tilodem 50-pulbere hidrosolubilă la 1000kg furaj, timp de 5-7 zile consecutiv.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Este recomandat ca tratamentele să se inițieze după efectuarea antibiogramii. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale.

Pe toată durata tratamentului, animalele trebuie să bea numai apa medicamentată.

Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în toată masa acestuia

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Pentru carne și organe de porc: 10 zile de la ultima administrare.

Pentru carne și organe de pasăre: 4 zile de la ultima administrare. Pentru ouă: 4 zile de la ultima administrare.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

A se păstra în ambalajul original, la temperatura camerei (15-25°C), ferit de umiditate și lumina solară directă.

După deschiderea ambalajului, produsul se va utiliza imediat.

Apa medicamentată are o valabilitate de 24 ore de la data preparării.

Furajul medicamentat are o valabilitate de 3 luni de la data realizării amestecului.

A nu se folosi după data de expirare menționată pe etichetă.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tilozină sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preveni orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănușilor, a ochelarilor de protecție și măștilor de protecție pentru praf.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii, adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feței, buzelor sau pleoapelor însoțite de dificultăți ale respirației, necesită asistență medicală de urgență.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Pentru protecția mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. ALTE INFORMAȚII

Prezentare: Pungi PET cu inserție de aluminiu, termosudate, ce conțin 10g, 25g, 50g, 100g, 500g, 1000g, 5kg, 10kg și saci PET cu inserție de aluminiu a 25kg, 50kg.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

SC DELOS IMPEX '96 SRL, Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov. Tel: 0372.714.433, Fax: 0372.871.445.