

Narcoxyl 2

solutie injectabila cu xilazina ca sedativ, anestezic, analgezic si miorelaxant

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer

Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Narcoxyl 2, solutie injectabila cu xilazina ca sedativ, anestezic, analgezic si miorelaxant

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Xilazina (sub forma hidroclorica) 20 mg / ml
Metilparaben
Clorura de sodiu
Apa pentru injectii

INDICAȚII

Analgezie pentru proceduri dureroase cum sunt tratamentul dentar, chirurgia plagilor superficiale, castrare, ecornare, chirurgia mamara si aplicarea inelelor nazale.

Sedarea utilizata in cazul unor proceduri cum sunt cele radiologice, potcovire, curatarea ongoanelor, incarcarea si transportul animalelor.

Miorelaxant pentru proceduri chirurgicale si pentru utilizare in combinatie cu anestezia cu ketamina.

Premedicație sedativa in combinatie cu ketamina, I-polamidon, butorfanol.

CONTRAINDICAȚII

Nu se va utiliza la vaci in ultimul trimestru de gestatie deoarece poate produce avort. Nu se va utiliza la animalele cu torsiune gastrica, cu obstructii sau corpi straini esofagieni.

REAȚII ADVERSE

Poate apare avort in ultimul trimestru de gestatie la vaci, depresia pulsului si respiratiei, voma la caini si pisici. Poate apare timpanism la rumegatoare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Cai, caini, pisici, vaci, oi, capre, porci, rozatoare, porci de Guineea, hamsteri, iepuri si animale salbatice

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Xilazina	Specii	Cale de administrare	Narcoxyl ml	Xylazine mg/ kg greutate corporala
In combinatie cu anestezice	Cai	i.v. i.m.	2-5 ml / 100 kg g.c. 7.5-15 ml /100 kg g.c.	0.4 - 1 mg / kg g.c. 1.5 - 3 mg /kg g.c.
	Caine	i.v., i.m.	0.5-1.5 ml /10 kg g.c.	1-3 mg / kg g.c.
	Pisica	i.m.	0.05-0.1 ml / kg g.c.	1 - 2 mg / kg g.c.
	Iepure	i.m.	0.2-0.25 ml /kg g.c.	4 - 5 mg / kg g.c.
	Porc de guineea, hamster	i.m.	0.2-0.25 ml / kg g.c.	4 - 5 mg / kg g.c.
	Animale salbatice	i.m.	0.0025-0.5 ml / kg g.c.	0.05 -10 mg / kg g.c.
Narcoxyl singur	Porc	i.m.	0.1 – 0.2 ml / kg g.c.	2 - 4 mg / kg g.c.
	Pisica	i.m.	0.1-0.2 ml / kg g.c.	2 - 4 mg / kg g.c.
Narcoxyl singur	Vaca	i.v.	Doza I 0.08-0.12 ml /100 kg g.c. Doza II 0.17- 0.25 ml /100 kg g.c. Doza III 0.33-0.50 ml /100 kg g.c.	16 - 24 µg / kg g.c. 34 - 50 µg / kg g.c. 66 - 100 µg / kg g.c.
		i.m.	Doza I 0.25 ml / 100 kg g.c. Doza II	50 µg / kg g.c.

			0.50 ml / 100 kg g.c. Doza III 1.0 ml / 100 kg g.c. Doza IV 1.5 ml / 100 kg g.c.	100 µg / kg g.c. 200 µg / kg g.c. 300 µg / kg g.c.
	Oi si capre	i.m.	0.05 – 0.25 ml / 10 kg g.c.	0.1 – 0.5 mg / kg g.c.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Doza I: sedare și analgezie pentru intervenții minore.

Doza II: sedare moderată, analgezie și relaxare musculară pentru proceduri chirurgicale minore.

Doza III: sedare profundă, analgezie și relaxare musculară puternică pentru proceduri chirurgicale majore. La aceasta doza vacile cad în decubit.

Doza IV: rezervată pentru cazuri speciale; numai administrare i.m.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și lapte: 24 ore

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura camerei 15 - 25 °C .

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 4 săptămâni.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Xylazina poate produce vomă la caine și pisica. De aceea se recomandă dieta înainte de administrarea NARCOXYL 2. La cai poate apărea bradicardie extremă în timpul sedării. În aceste cazuri se recomandă injectarea de atropina sulfat (1 mg/100 kg g.v, i.m. sau i.v.).

Bovinele sunt de aproximativ zece ori mai sensibile la Xilazina decât caii iar dozele mai mari vor determina adoptarea decubitului.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În caz de auto-administrare, accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta, dar în nici un caz nu șofați, întrucât poate apărea starea de sedare și modificări ale tensiunii arteriale.

A se evita contactul cu pielea, ochii sau mucoasele.

După expunere, spălați imediat zona cu multă apă.

Este contraindicată în ultimul trimestru de gestație la vaci.

Nu se va amesteca cu soluții uleioase sau alcaline. La cai, interacțiunile cu sulfamide potentate sau derivați de fenotiazina pot determina probleme circulatorii.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

ALTE INFORMAȚII

Flacoane din sticlă și PET, închise cu dop din cauciuc bromobutilic și sigilate cu capsula din aluminiu. Flacoanele contin 20 și 50 ml soluție.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L., ILFOV,

Șos. De Centură Nr.27 – 28, Com. Chiajna

Tel: 021.311.83.11/12; Fax: 021.311.83.17