

# HALOCUR

0.5 mg/ml soluție orală pentru viței

## DECLARAREA SUBSTANTELOR ACTIVE SI A ALTOR SUBSTANTE

Halofuginonă bază (ca sare lactat)	0.50 mg/ml
Acid benzoic (E 210)	1.00 mg/ml
Tartrazină (E 102)	0.03 mg/ml

## FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție orală

## DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Flacon de 500 ml conținând 490 ml soluție orală / flacon de 1000 ml conținând 980 ml soluție orală

## SPECII ȚINTĂ

Viței nou-născuți

## INDICAȚII

La vițeei nou-născuți:

- Prevenția diareei cauzată de *Cryptosporidium parvum*, diagnosticată în ferme cu istoric de criptosporidioză.  
Administrarea trebuie să înceapă în primele 24 - 48 ore de viață.
- Reducerea diareei cauzată de *Cryptosporidium parvum* diagnosticată.  
Administrarea trebuie să înceapă în interval de 24 ore de la debutul diareei.

În ambele cazuri, a fost demonstrată reducerea excreției de oochiști.

## MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală la viței după hrănire:

- 35 kg < viței ≤ 45 kg: 8 ml de HALOCUR o dată pe zi timp de 7 zile consecutive
- 45 kg < viței < 60 kg: 12 ml de HALOCUR o dată pe zi timp de 7 zile consecutive

Pentru greutatea mai mici sau mai mari, trebuie efectuat un calcul exact (2 ml/10 kg).

Pentru a asigura o dozare corectă este necesară utilizarea fie a unei seringi, fie a oricărui dispozitiv special pentru administrare orală.

Tratamentul următor trebuie efectuat în fiecare zi la aceeași oră.

Odată ce a fost tratat primul vițel, toți vițeeii născuți ulterior trebuie tratați sistematic atâta timp cât riscul diareei cauzată de *C. parvum* persistă.

## TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 13 zile.

## ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

**Nu se administrează pe stomacul gol.**

Nu se administrează în cazul diareei instalată de mai mult de 24 ore sau la animale slăbite.

Pentru tratamentul vițeeilor anorexici produsul se administrează într-o jumătate de litru de soluție de electroliți. Animalele trebuie să primească suficient colostru conform bunei practici de creștere.

### Supradozare:

**Datorită faptului că simptomele de toxicitate pot apărea la dublul dozei terapeutice, este necesară aplicarea cu strictețe a dozajului recomandat. Simptomele de toxicitate includ diareea, sânge vizibil în fecale, scăderea consumului de lapte, deshidratare, apatie și prostrație. Dacă apar semnele clinice de toxicitate, tratamentul trebuie întrerupt imediat și animalele trebuie hrănite cu lapte sau înlocuitori de lapte nemedicamentați. Rehidratarea poate fi necesară.**

*Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:*

- Contactul repetat cu produsul poate duce la alergii cutanate.
- Se va evita contactul pielii sau ochilor cu produsul. În caz de contact al pielii sau ochilor, se va clăti complet zona expusă cu apă curată. Dacă iritația oculară persistă, se va cere sfatul medicului.
- Se vor purta mănuși de protecție în timp ce se manipulează produsul.
- Se vor spăla mâinile după utilizare.

## CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

Acest produs medicinal nu necesită condiții speciale de depozitare.

## PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ

**HALOCUR nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.**

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.