

Banminth Paste

Pastă orală pentru câini

Compoziție cantitativă și calitativă

Substanța activă

Pirantel pamoat 2,162 U.S.P.

Excipienți

Metil parahidroxibenzoat 0,080 Ph. Eur.

Propil parahidroxibenzoat 0,020 Ph. Eur.

Bronopol 0,010 B.P.

1g de produs

Forma farmaceutică

Pastă orală.

Indicații pentru utilizare

Câine : Pentru controlul și tratamentul infestațiilor parazitare cu viermi rotunzi și viermi cu cârlig la câinii adulți și la pui.

Produsul este eficient împotriva următorilor helminți la câinii adulți și la pui :

- Toxocara canis
- Toxoascaris leonina
- Ancylostoma spp.
- Uncinaria stenocephala

Metodă de administrare

Administrare : Se va îndepărta capacul protector de pe vârful seringii. Se va pune vârful seringii dozatoare pe spatele limbii și se va injecta doza corespunzătoare. De asemeni, pasta poate fi amestecată cu hrana. În acest caz este foarte important ca, cantitatea de hrană administrată pisicii să un fie mai mare decât cea pe care o consumă în mod normal.

Dozaj : 2 cm de produs sunt suficienți pentru a trata 1 kg g.c. 1g de pastă pentru 1,5kg g.c.

Programul antihelmintic

- **Cățele:**

În lactație : primul tratament va fi administrat la 2 săptămâni după fătare cu repetare din 2 în 2 săptămâni până la înțarcarea puilor.

Se recomandă ca tratamentul cățelei să se efectueze în același timp cu cel al puilor.

- **Câini adulți:**

Din 3 în 3 luni.

- **Pui:**

Primul tratament va fi făcut la vârsta de 2 săptămâni, cu repetare din 2 în 2 săptămâni până la vârsta de 12 săptămâni. După această vârstă tratamentele trebuie efectuate la 3 luni interval. Când se suspectează sau se identifică semne clinice determinate de infestațiile cu viermi rotunzi sau viermi cu cârlig se recomandă efectuarea a două tratamente la o săptămână interval.

Programul antiparazitar pentru puii cumpărați de la un crescător

Dacă puilul a fost cumpărat de la o canisă sau de la un crescător care nu a respectat programul de deparazitare de rutină pentru pui se recomandă aplicarea următorului program: deparazitare la cumpărare, apoi din 2 în 2 săptămâni până la vârsta de 12 săptămâni. După această vârstă se recomandă tratamentul la 3 luni interval.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi) (dacă este necesar)

Produsul are o marjă de siguranță foarte mare iar supradozarea nu va produce, în mod normal, reacții adverse la pui sau la câinii adulți.

Precauții speciale pentru speciile țintă

În cazul apariției manifestărilor clinice caracteristice acestor infestații parazitare trebuie tratați toți câinii care vin în contact cu animalele bolnave și trebuie luate toate măsurile care să reducă contaminarea mediului și să prevină reinfestarea câinilor.

Perioada de așteptare

Nu este necesar.

Precauții speciale de depozitare

Se va depozita la temperatura camerei (15 - 25 °C), într-un loc uscat. Se va proteja de acțiunea razelor solare. Se va feri de accesul copiilor.

Prezentare

Tuburi ce conțin 10g, 16g sau 24g de pastă.

Fabricat de: Pfizer H.C.P Corporation