

Linco-Spectin™ 880 Premix

Lincomicină-Spectinomycină.

Compoziție:

1,5 kg de Linco-Spectin 880 Premix conține:
Lincomicină (Lincomicină Clorhidrat)440 g
Spectinomycină (Spectinomycină sulf.Tetrahidrat)440 g
Excipient: șrot de soia până la 1 kg

Indicații

Suine

Pentru prevenirea sau tratamentul bolilor digestive cauzate de sau în asociație cu *Serpulina hyodisenteriae* (dizenterie suină), *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* și alte bacterii sensibile la această combinație. Ajută în prevenirea infecției micoplasmice la porci.
Tratamentul sindromului MMA cu origine bacteriană la scoafă.

Dozaj și administrare

Boli digestive:

Tratament: 188 g **Linco-Spectin 880 Premix** / tona de furaj (110 g de substanță activă pentru tona de furaj) pentru o perioadă de 3 săptămâni.

Prevenție: 75g de **Linco-Spectin 880 Premix** / tona de furaj (44g substanță activă/tona de furaj) în decursul perioadei de risc.

Sindrom MMA: 75-150g de Linco-Spectin 880 Premix pentru tona de furaj pentru o perioadă de 5-10 zile înainte de fătare și 2-3 săptămâni după parturiție.

Îmbunătățirea sporului mediu zilnic și a ratei de conversie a furajului: 38g **Linco-Spectin 880 Premix**/tona de furaj (22g de substanță activă pentru 1000 kg de furaj) pentru porcii de până la 55-57 kg g.v. și 19g **Linco-Spectin 880 Premix**/tona de furaj (11g de substanță activă pentru 1000 kg furaj) pentru porcii în greutate de la 55-57 kg g.v. până la livrare.

Contraindicații

Nu este permis accesul iepurilor, hamsterilor, cobailor, cailor sau al rumegătoarelor la apa sau hrana ce conține lincomicină. Ingestia de lincomicină de către aceste specii poate avea ca efect tulburări gastrointestinale severe.

Nu este destinat consumului uman.

DOZAJUL pentru LINCO-SPECTIN 44 și 880 PREMIX:

Substanța activă grame	LINCO-SPECTIN 44 Premix – grame	LINCO-SPECTIN 880 Premix - grame
11	250	19
22	500	38
44	1000	75
88	2000	150
110	2500	188

Reacții adverse

Ocazional, la porcii care consumă furajul cu lincomicină, în decursul primelor 2 zile de la începerea tratamentului, poate fi constatată apariția fecalelor moi și/sau o ușoară inflamare și iritare a anusului. Rar, la porci se poate observa o înroșire a pielii și apariția unei ușoare stări de stress. Aceste semne diminuează, de obicei, în decurs de 5 - 8 zile, fără a fi necesară întreruperea tratamentului.

Perioada de așteptare

Porcii destinați abatorizării nu vor fi sacrificați decât după trecerea a 24 de ore de la ultimul tratament.

Mod de prezentare

Pungi (saci) cu 4,5 kg de produs.

Incompatibilități și stabilitate

Nici o incompatibilitate nu a fost raportată.
Linco-Spectin este compatibil clinic cu salinomycină.

Depozitare

La temperatura camerei.
Sacii deschiși vor fi depozitați într-un spațiu uscat.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !