

Ampidexalone

soluție antiinfecțioasă și antiinflamatorie

Compoziție

Fiecare 100 ml conține:

Suspensie pentru injecție

Ampicilină trihidrat	10 g,
(echivalent ampicilină bază de:	8,7 g),
Colistin sulfat	25 milioane UI,
Dexametazonă	25 g,

(Ex: Ampicilină 87 mg/ml – Colistin 250 000 UI/ml – Dexametazonă 0,25 mg/ml).

Prezentare farmaceutică

Flacon de 100 ml.

Proprietăți

Combinăția celor două antibiotice sinergice, ampicilina și colistin, active împotriva organismelor Gram pozitive și Gram negative, asociate cu un corticosteroid foarte puternic, dexametazona, permite tratarea unui număr mare de infecții precum și reacțiile inflamatorii ale acestora.

Indicații

Vaci, oi, cai, porci: tratamentul preventiv și curativ al infecțiilor cauzate de organisme sensibile la ampicilină și colistin.

Doze și mod de administrare

Pe cale parenterală: intra-muscular; sub-cutanat; intra-perineal.

Vaci, oi, cai, porci: 1 ml /10 kg greutate vie administrat la fiecare 12 ore.

Durata tratamentului: 3 zile consecutive.

Contraindicații

A nu se folosi pentru femelele în a doua jumătate a gestației.

A nu se folosi pentru iepuri, rozătoare.

Recomandări

Agitați bine înainte de folosire.

A nu se folosi intravenos.

Perioada de așteptare

Animalele tratate nu se vor sacrifica în scopul consumului uman în timpul și nici 21 zile după încheierea tratamentului.

Laptele procurat de la femelele în tratament nu se va consuma decât după o perioadă de 4,5 zile (9 mulgeri).

Producător

COOPHAVET- FRANȚA, St Herblon – BP – 44153 ANCENIS Cedex.

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează pe bază de prescripție medicală.