

Lincomix® 110

**Pentru creșterea sporului zilnic și îmbunătățirea ratei de conversie a furajului la puii broiler.
Pentru tratamentul și prevenția dizenteriei la suine.**

Compoziție

Fiecare kilogram conține:

Substanță activă:

Lincomicină 110 g
(lincomicină clorhidrat) 110 g,

Excipient:

șrot de soia până la 1 kg.

Important

Trebuie bine omogenizat în furaj înainte de utilizare. Păstrați sacii desfăcuți în locuri uscate. Păstrați produsul la temperatura camerei.

Indicații

Păsări:

Pentru prevenirea enteritei necrotice la pui, în doza de 2,2 până la 4,4 g lincomicină pe tona de furaj.

Poate fi utilizat și pentru îmbunătățirea sporului mediu zilnic la broileri în aceeași doză: 2,2 – 4,4 g lincomicină/tona de furaj.

Pentru tratamentul enteritei necrotice la pui: 44g lincomicină (400g lincomix 110/tona de furaj) timp de 7-10 zile.

Suine:

Pentru tratamentul dizenteriei suine cu *Serpulina*.

Pentru tratament se recomandă doza de 110 ppm(1kg premix/tona de furaj) pentru o perioadă de 3 săptămâni.

Pentru prevenția acestei boli se vor utiliza 44 ppm(400g produs/tona de furaj) timp de 3 săptămâni.

Recomandări

Când se utilizează **LINCOMIX® 110 Premix** (110 g/kg), pentru a realiza o mai bună omogenizare a lincomicinei în furaj, este recomandată prepararea unui preamestec de **LINCOMIX® 110 Premix** (110 g/kg) cu o cantitate mică de furaj, aceasta înainte de a se adăuga produsul în cantitatea totală de furaj.

Grame Lincomicină Per Tona de Furaj	Cantitatea de Lincomix® 110 Premix Necesară Per Tona de Furaj
2,2 g	20 g
3,3 g	30 g
4,4 g	40 g
44,0 g	400 g
88,0 g	800 g
110,0 g	1.000 g

La prepararea acestui premix trebuie impuse norme cantitative și calitative. Astfel, între două șarje consecutive, instalațiile de premixare trebuie golite complet de furaj pentru a nu apărea erori de dozare.

Remanență

Nu necesită perioadă de așteptare înainte de sacrificare.

Ocazional, la porcii care consumă furajul cu lincomicină, în decursul primelor 2 zile de la începerea tratamentului, poate fi constatată apariția fecalelor moi și/sau o ușoară inflamare și iritare a anusului. Rar, la porci se poate observa o înroșire a pielii și apariția unei ușoare stări de stress. Aceste semne diminuează, de obicei, în decurs de 5 - 8 zile, fără a fi necesară întreruperea tratamentului. Folosirea produsului în furajul altor specii, decât pentru pui și suine, poate determina tulburări gastrointestinale.

Prezentare

Saci de 5 și 25 kg.

Numai pentru uz veterinar !

Se eliberează pe bază de prescripție medicală !