

# GESTAVET-PROST 75 µg/ml

soluție injectabilă pentru vaci și scroafe

## 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva, 135.  
17170 - AMER (Girona)  
SPANIA

## 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

GESTAVET-PROST, soluție injectabilă 75 µg/ml pentru vaci și scroafe  
d-cloprostenol

## 3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI):

Compoziție pe ml:

*Substanță activă:*

d-cloprostenol (în formă de sare sodică) 75 µg

*Excipienți:*

Clorocrezol 1 mg

## 4. INDICAȚIE (INDICAȚII):

**Vaci și junci:**

- Sincronizare și inducere a calduriului.
- Lipsa calduriului după fătare.
- Tratament adjuvant în endometrita cronică și în piometru.
- Chiști luteici.
- Inducerea avortului.

**Scroafe:**

- Inducerea fătării

## 5. CONTRAINDICAȚII:

A nu se utiliza la:

- Vaci gestante la care nu se dorește provocarea avortului.
- Scroafe la care nu se dorește inducerea fătării.
- Scroafe la care se prevede o fătare distocică cauzată de poziții anormale ale fătului, obstacole mecanice, etc.
- Animale cu boli cardiovasculare sau respiratorii.

## 6. REACȚII ADVERSE:

Nu s-au observat efecte secundare adverse la animalele tratate.

Dacă remarcăți efecte secundare importante sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, informați medicul veterinar.

## 7. SPECII ȚINTĂ:

Vaci și scroafe.

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Cale intramusculară.

**Vaci și june:**

Sincronizare și inducere a caidurilor:

Pentru a sincroniza un grup de animale ce se află în diferite faze ale ciclului estral, a se administra două injecții de GESTAVET-PROST (2 ml/animal, echivalent a 150 µg d- cloprostenol/animal), în interval de 11 zile. Pentru a obține rezultate optime vor trebui inseminate animalele la primul ciclu estral după tratament. Dacă se utilizează inseminarea fără detectare de caiduri, a se realiza două inseminări la 72 și 96 ore după cea de a doua injecție.

Lipsa caidurilor după fătare:

A se verifica prezența corpului galben prin palpate rectală și a se administra 2 ml de GESTAVET-PROST/animal (echivalent a 150 µg d- cloprostenol/animal). A se insemina animalele care sunt în caiduri. A se administra o a doua doză 11 zile după prima animalelor care nu sunt în caiduri și a se însemina după 72 și 96 ore de la cea de a doua aplicare.

Tratament adjuvant în endometrioza cronică și piometru:

A se administra o doză de GESTAVET-PROST (2 ml/animal, echivalent a 150-µg d-cloprostenol/animal). În anumite cazuri poate fi necesară aplicarea unei a doua doze după 10-12 zile.

Chiști luteinici:

La diagnosticul de chiști ovarieni luteinici, a se administra o doză de GESTAVET- PROST (2 ml/animal, echivalent a 150 µg d- cloprostenol/animal).

Persistența „corpus luteum”

După diagnosticarea „corpus luteum” persistent, se va administra GESTAVET-POST în doză 2 ml/animal, echivalent a 150 µg d- cloprostenol/ animal.

Inducere a avortului:

Avortul poate fi indus cu o doză de GESTAVET-PROST (2 ml/animal, echivalent a 150 µg d-cloprostenol/animal) administrată în perioada 1 săptămână și 150 zile de gestație. Poate fi necesară extracția manuală a fătusului.

**Scroafe:**

Inducere a fătării:

A se administra 1 ml de GESTAVET-PROST/scroafa (echivalent a 75 µg d- cloprostenol/scroafa) cu trei zile anterior datei prevăzute pentru fătare.

**9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:**

- A nu se administra la femele gestante dacă nu se dorește avortul
- Inducerea fătării la scroafe înainte de 111 zile de gestație poate determina mortalitatea produșilor și o creștere a numărului de scroafe ce necesită intervenție manuală la fătare.
- A nu se administra pe cale intravenoasă.

**10. TIMP DE AȘTEPTARE:**

*Came:* Bovine și porcine: 24 ore

*Lapte:* zero zile.

**11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Păstrați produsul în frigider (2 °C - 8 °C).

Păstrați flaconul în cutia de carton pentru a fi protejat împotriva luminii. Nu utilizați după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului: 28 de zile.

**12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE):**

- Produsul nu trebuie să fie manipulat de femei însărcinate nici de astmatici sau persoane cu probleme bronhiale sau alte afecțiuni respiratorii.
- A se evita contactul cu ochii. În caz de contact accidental, a se spăla imediat ochii cu apă din abundență.
- A se evita contactul cu pielea. În cazul vărsării produsului pe piele, a se spăla imediat zona respectivă cu apă din abundență.

**13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:**

**15. ALTE INFORMAȚII:**

*Prezentare:*

Flacon de 10 ml

Flacon de 20 ml

10 flacoane de 10 ml

10 flacoane de 20 ml

Nu toate formele de prezentare pot fi comercializate.