

EFICUR

50 mg/ml Ceftiofur suspensie injectabilă pentru porcine și bovine

Compoziție:

Ceftiofur 50 mg (sub formă de Ceftiofur Clorhidrat).
Suspensie uleioasă de culoare albă sau gălbuie

Indicații:

Infecții asociate cu bacterii sensibile la ceftiofur.

Porcine: În tratamentul bolilor respiratorii bacteriene asociate cu *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* și *Streptococcus suis*.

Bovine: Pentru tratamentul bolilor respiratorii bacteriene asociate cu *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* și *Haemophilus somnus*. Pentru tratamentul necrobacilozei interdigitale acute (panarițiu, pietin) asociată cu *Fusobacterium necrophorum* și *Bacteroides melaninogenicus* (*Phorphyromonas asaccharolytica*).

Pentru tratamentul componentei bacteriene a metritei acute post-partum (puerperală) până în 10 zile după fătare asociată cu *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* și *Fusobacterium necrophorum*.

Mod de administrare:

Porcine: 3 mg ceftiofur/kg g.c/zi timp de 3 zile prin injectare intramusculară, de ex. 1 ml de EFICUR/16 kg g.c/zi.

Bovine: Tratamentul bolilor respiratorii: 1 mg ceftiofur/kg g.c/zi timp de 3 până la 5 zile prin injectare subcutanată, de ex. 1 ml de EFICUR/50 kg g.c/zi.

Tratamentul necrobacilozei interdigitale acute: 1 mg ceftiofur/kg g.c/zi timp de 3 zile prin injectare subcutanată, de ex. 1 ml de EFICUR/50 kg g.c/zi. Metrită acută post-partum până în 10 zile după fătare: 1 mg ceftiofur/kg g.c/zi timp de 5 zile consecutive prin injectare subcutanată, de ex. 1 ml de EFICUR/50 kg g.c/zi.

Injectările ulterioare trebuie administrate în locuri diferite. În caz de metrită acută post-partum, ar putea fi necesară, în anumite cazuri, terapie suplimentară de susținere.

Timp de așteptare:

Porcine: Carne și organe: 5 zile.

Bovine: Carne și organe: 8 zile; Lapte: Zero zile.

Ambalaj:

Flacoane de 100/250 ml