

# Startvac

emulsie injectabilă pentru pentru bovine

## 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:  
LABORATORIOS HIPRA, S.A., Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), SPAIN

## 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

STARTVAC emulsie injectabilă pentru bovine.

## 3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

O doză (2 ml) conține:

*Escherichia coli* (J5) inactivat ..... > 50 RED<sub>60</sub> \*  
Tulpină SP 140 de *Staphylococcus aureus* (CP8) inactivat, ce exprimă Complexul Antigenic Asociat cu „Slime” (SAAC)  
..... > 50 RED<sub>80</sub> \*\*

\* RED<sub>60</sub>: Doza efectivă pe iepure la 60 % din animale (serologie).

\*\* RED<sub>80</sub>: Doza efectivă pe iepure la 80 % din animale (serologie).

Parafină lichidă: 18,2 mg.

Alcool benzilic: 21 mg.

STARTVAC este o emulsie injectabilă omogenă de culoare ivorie.

## 4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru vaccinarea efectivelor de vaci și juninci sănătoase, a efectivelor de vaci de lapte cu probleme de mastită recurentă, pentru a reduce incidența mastitei subclinice precum și incidența și gravitatea semnelor clinice de mastită clinică cauzate de *Staphylococcus aureus*, coliformi și stafilococi coagulazo-negativi.

Programul complet de vaccinare induce imunitatea din aproximativ a 13 a zi după prima injecție până în aproximativ a 78 a zi după cea de-a treia injecție.

## 5. CONTRAINDICAȚII

Nu există.

## 6. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse foarte rare:

Pot apărea reacții locale tranzitorii ușoare până la moderate după administrarea unei doze de vaccin. Acestea ar fi în principal: inflamare (în medie până la 5 cm<sup>2</sup>) care dispare în cel mult 1 sau 2 săptămâni. În anumite cazuri, poate apărea și durerea la locul inoculării care va scădea în intensitate în mod spontan în maxim 4 zile.

- În primele 24 de ore după injectare poate apărea o creștere tranzitorie medie a temperaturii corpului cu aproximativ 1°C, la anumite vaci până la 2°C.
- Pot apărea reacții de tip anafilactic în cazul anumitor animale sensibile, care pot pune în pericol viața acestora. În acest caz, trebuie administrat rapid tratamentul simptomatic adecvat. Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:
- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

## 7. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii și juninci).

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare intramusculară.

Ar fi de preferat ca injecțiile să fie administrate alternativ pe părțile laterale ale gâtului.  
Se va administra o doză (2 ml) prin injecție intramusculară profundă în mușchii gâtului cu 45 zile înainte de data prevăzută pentru parturiție și după o lună se va administra a doua doză cu (cel puțin 10 zile înainte de fătare). A treia doză se va administra la 2 luni după fătare.  
Programul complet de vaccinare trebuie repetat odată cu fiecare perioadă de gestație.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

A se lăsa vaccinul să ajungă la o temperatură de +15 °C până la + 25 °C înainte de utilizare.  
Agitați înainte de utilizare.

## 10. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.  
A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (+2 °C până la +8 °C).  
A se proteja de lumină.  
A nu se congela.  
A nu se utiliza după data expirării inscripționată pe etichetă după EXP. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.  
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar 10 ore păstrat la +15 °C până la +25 °C.

## 12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

### Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Trebuie imunizat tot efectivul.

Imunizarea trebuie considerată ca o componentă a unui program complex de control al mastitei care să se adreseze tuturor factorilor importanți de sănătate a ugerului (de ex. tehnică de muls, gestionarea perioadei de repaos mamar și reproducere, igienă, alimentație, adăpostire, așternut, confortul vacilor, calitatea aerului și apei, supravegherea stării de sănătate) și alte practici administrative.

### Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Numai animalele sănătoase trebuie imunizate.

### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Pentru utilizator:

Acest produs medicinal veterinar conține ulei mineral. Auto-injecția/injecția accidentală poate provoca dureri puternice și inflamații, în special dacă injecția se face în articulație sau în deget, iar în cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate îngrijiri medicale imediat. În cazul unei injecții accidentale cu acest produs medicinal veterinar, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs. Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului.

Pentru medic:

Acest produs medicinal veterinar conține ulei mineral. Chiar dacă au fost injectate cantități mici de produs, injecția accidentală cu acest produs poate provoca inflamație accentuată, care poate conduce, de exemplu, la necroză ischemică și chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată și spălarea zonei injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

### Utilizare în perioada de gestație și lactație:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

### Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu sunt disponibile informații cu privire la siguranța și eficacitatea acestui vaccin atunci când este utilizat cu alte produse medicinale veterinare. O decizie cu privire la utilizarea acestui vaccin înainte sau după administrarea unui alt produs medicinal veterinar trebuie luată, prin urmare, în funcție de fiecare caz individual.

### Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi):

Nu s-au observat reacții adverse, altele decât cele menționate în secțiunea "Reacții adverse", după administrarea unei doze duble de vaccin.

### Incompatibilități:

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar.

## 13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## 14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Informații detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenției Europene a Medicamentelor:

<http://www.ema.europa.eu/>

## 15. ALTE INFORMAȚII

### Dimensiuni ambalaj:

- Cutie de carton cu 1, 10 și 20 de flacoane din sticlă cu 1 doză.
- Cutie de carton cu 1 și 10 flacoane din sticlă cu 5 doze.
- Cutie de carton cu 1 și 10 flacoane din sticlă cu 25 de doze.
- Cutie de carton cu 1 flacon PET cu 5 de doze.
- Cutie de carton cu 1 flacon PET cu 25 de doze.
- Cutie de carton cu 1 flacon PET cu 125 de doze.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.