

Profender

soluție spot-on pentru pisici de talie mică
soluție spot-on pentru pisici de talie mijlocie
soluție spot-on pentru pisici de talie mare

Compoziție

Substanțe active:

Profender conține

Emodepside	21,4 mg/ml,
Praziquantel	85,8 mg/ml.

Fiecare doză unică (pipetă) de Profender conține:

	Volum	Emodepside	Praziquantel
Profender pentru pisici de talie mică (≥ 0,5 - 2,5 kg)	0,35 ml	7,5 mg	30 mg
Profender pentru pisici de talie mijlocie (> 2,5 - 5,0 kg)	0,70 ml	15 mg	60 mg
Profender pentru pisici de talie mare (> 5,0 - 8,0 kg)	1,12 ml	24 mg	96 mg

Excipienți:

butilhidroxianisole (E320; ca antioxidant)	5,4 mg/ml.
--	------------

Indicații

La pisici infestate sau expuse riscului de infestare cu mai multe tipuri de paraziți, viermi rotunzi și lați aparținând următoarelor specii:

Viermi rotunzi (Nematode)

Toxocara cati (aduți maturi, aduți imaturi, L4 și L3),
Toxascaris leonina (aduți maturi, aduți imaturi și L4),
Ancylostoma tubaeforme (aduți maturi, aduți imaturi și L4);

Viermi lați (Cestode)

Dipylidium caninum (forma adultă),
Taenia taeniaeformis (forma adultă),
Echinococcus multilocularis (forma adultă).

Contraindicații

Nu se utilizează la pisoi sub vârsta de 8 săptămâni sau la cei cu o greutate mai mică de 0,5 kg.

Reacții adverse

Salivație și vomă pot să apară în foarte puține cazuri. Aceste fenomene pot să apară când pisica linge locul de aplicare imediat după tratament. În foarte puține cazuri, după administrarea de Profender au fost observate următoarele: căderea parului, prurit și/sau inflamație, la locul de aplicare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Pisici.

Posologie, cale de administrare și mod de administrare

Numai pentru uz extern.

Dozare și schema de tratament


Dozele minime recomandate sunt de 3 mg emodepside / kg greutate vie și de 12 mg praziquantel / kg greutate vie, echivalent cu 0,14 ml Profender / kg greutate vie.

Greutatea pisicii (kg)	Tipul de pipetă utilizat	Volum (ml)	Emodepside (mg/kg g.v.)	Praziquantel (mg/kg g.v.)
≥0,5 - 2,5	Profender pentru pisici de talie mică	0,35	3 - 15	12 - 60
>2,5 - 5	Profender pentru pisici de talie mijlocie	0,70	3 - 6	12 - 24
>5 - 8	Profender pentru pisici de talie mare	1,12	3 - 4,8	12 - 19,2
>8	Se va utiliza o combinație corespunzătoare de pipete			


O singură administrare per tratament este eficientă.

Recomandări privind administrarea corectă

Scoateți o pipetă din pachet. Țineți pipeta în poziție verticală, deșurubați și luați capacul pipetei. Utilizați celălalt capăt al capacului pentru a desigila pipeta.



Faceți o cărare în blana pisicii de la gât la baza craniului, astfel încât pielea să fie vizibilă. Plasați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta ferm de câteva ori pentru a goli conținutul direct pe piele. Aplicarea la baza craniului reduce posibilitatea ca pisica să se lîngă și să ingereze produsul. Se va aplica numai pe piele intactă și sănătoasă.

**Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă și cutie.

Atenționări speciale

A nu se administra oral sau parenteral.

Nu se vor lăsa pisicile tratate sau alte pisici să lîngă locul de aplicare cât este umed.

Experiența referitoare la utilizarea produsului la animale bolnave și debile este limitată de aceea, la aceste animale, produsul se va utiliza numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc.

Șamponarea sau introducerea animalelor în apă imediat după tratament poate reduce eficacitatea produsului. Animalele tratate nu vor fi spălate decât după ce soluția s-a uscat.

Pentru utilizator:

Nu fumați, nu mâncați, nu beți în timpul aplicării produsului.

Evitați contactul direct cu zona tratată cât aceasta este umedă. Țineți copiii la distanță de animalele care au fost de curând tratate.

Spălați bine mâinile după aplicarea produsului.

Dacă produsul ajunge accidental pe piele, spălați imediat cu săpun și apă.

Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălați ochii cu multa apă.

Dacă semnele de intoxicație cutanată sau oculară persista sau în caz de ingerare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Nu lăsați copiii în contact cu animalul tratat pe o perioadă îndelungată (în timpul somnului, de exemplu) în primele 24 de ore de la aplicarea produsului.

Deși produsul a fost bine tolerat de către pisicile gestante, studiile efectuate pe șobolani și iepuri au arătat că emodepsidul poate interfera cu dezvoltarea embrio-fetală. De aceea, femeile însărcinate vor evita contactul cu produsul sau vor purta mănuși de unică utilizare când administrează produsul.

Persoanele care manipulează produsul în mod frecvent (de exemplu medicii veterinari, crescătorii de pisici) trebuie să poarte mănuși de unică utilizare când administrează produsul.

Solventul din acest produs pătează anumite materiale cum ar fi pielea, țesăturile, plasticul și suprafețele finite. Lăsați locul de aplicare să se usuce înainte de contactul cu astfel de materiale.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor

Profender nu trebuie să fie deversat în ape de suprafață deoarece emodepsidul are efecte dăunătoare asupra organismelor acvatice.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Alte informații

Profender poate fi utilizat în timpul perioadei de gestație și lactație.

Rezistența paraziților la orice clasă de antihelmintice se poate instala după utilizarea repetată și frecventă a unui antihelmintic din clasa respectivă.

Echinococoza reprezintă un pericol foarte mare pentru oameni. Deoarece echinococoza este o boală declarabilă la OIE, există indicații clare referitoare la tratament, urmărirea evoluției și siguranța oamenilor, indicații care se obțin de la autoritățile competente.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Deținătorul Autorizației de Comercializare

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania