

# Bayvarol 3.6 mg/bandă

benzi impregnate pentru albine melifere

## Compoziție

O bandă conține:

Substanță activă:

Flumetrin 3.6 mg.

## Indicație

Pentru diagnosticul și tratamentul infestării cu *Varroa Destructor* la albinele melifere.

## Contraindicații

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente pentru combaterea Varroa.

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente pentru combaterea nosemozei.

A nu se utiliza în timpul perioadelor de cules.

## Reacții adverse

Nu se cunosc. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

## Specii țintă

Albine melifere.

## Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare

### Diagnostic

Benzile se introduc în stup timp de 24 de ore. Înainte de introducerea benzilor, acoperiți podeaua stupului sau tăvița din stup cu o coală albă de hârtie. După 24 de ore de la introducerea benzilor, verificați dacă pe coală există căpușe de Varroa moarte.


### Tratament

Benzile vor fi lăsate în colonie maxim săse săptămâni, după care se vor scoate. Coloniile normal dezvoltate primesc patru benzi. Nucleele și coloniile tinere primesc jumătate de doză de exemplu, două benzi. Coloniile mari care au mai multe rame cu puiet, primesc patru benzi pentru fiecare spațiu dintre ramele cu puiet, distribuite uniform.

Eficacitate maximă se obține când Bayvarol se utilizează spre sfârșitul verii, după recoltarea mierii. Bayvarol poate fi utilizat în orice moment al anului în scop de diagnostic sau în infestații severe, când este amenințată supraviețuirea coloniei.

## Recomandări privind administrarea corectă

Benzile de Bayvarol sunt suspendate între spațiile dintre faguri în zona centrală, astfel încât să fie acoperite de albine pe ambele fețe. Ambale agățătoare ale unei benzi se îndoieie în sus în aceeași direcție, de-a lungul liniei marcate și se agață de marginea superioară a ramelor de lemn.



În coloniile mari care au mai multe rame cu puiet, cele două benzi pot fi unite astfel încât la introducerea și extragerea lor să nu fie nevoie să îndepărtem ramele.

Eficacitate maximă se obține când Bayvarol se utilizează spre sfârșitul verii, după recoltarea mierii. Bayvarol poate fi utilizat în orice moment al anului în scop de diagnostic sau în infestații severe, când este amenințată supraviețuirea coloniei.

## Timp de așteptare

0 (zero) zile.

## Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C. A se proteja de lumină. A se păstra în loc uscat. A nu se desface folia decât înainte de a se utiliza benzile.

## Atenționări speciale

Numai pentru diagnosticul și tratamentul infestării cu *Varroa* la albinele melifere.

Spălați-vă pe mâini după utilizarea benzilor, înainte de a consuma alimente și după terminarea lucrului.

## Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

## Alte informații

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

## Deținătorul Autorizației de Comercializare

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania.