

Drontal Cat

tablete pentru pisici

Compoziție

Fiecare tabletă conține

Substanțe active:

Pirantel embonat (pamoat) 230.0 mg,
Praziquantel 20.0 mg;

Excipienți:

Amidon de porumb, celuloză microcristalină, polivinil pirolidonă, stearat de magneziu, siliciu coloidal anhidru, hidroxi-propil metilceluloză, polietilen glicol 4000, dioxid de titan.

Indicații

Pentru tratamentul infestațiilor mixte cu viermi rotunzi și viermi lați la pisici, determinate de:

Stadii adulte de ascarizi: *Toxocara cati* (syn. *mystax*);

Stadii adulte de viermi cu cârlig: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*.

Tenii (viermi lați): *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigera (Taenia) taeniaeformis*, *Mesocestoides spp.*, *Joyeuxiella spp*

Deoarece infestarea cu tenii la pisici apare în foarte scurt timp, în a treia săptămână de viață, tratamentul cu Drontal nu este indicat decât după vârsta de trei săptămâni.

Contraindicații

A nu se utiliza la pisoi care au vârsta mai mică de 6 săptămâni.

Drontal Cat nu va fi utilizat în timpul gestației.

A nu se utiliza simultan cu compuși care conțin piperazină.

Reacții adverse

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Pisici.

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare și mod de administrare

5 mg/kg praziquantel și 57.5 mg/kg pirantel embonat pe kilogram greutate vie

Este echivalent cu o tabletă Drontal Cat pe 4 kg greutate vie.

Pentru exemplificare a se vedea tabelul de mai jos:

Greutate corporală	Tablete
1.0 - 2.0 kg	1/2
2.1 - 4.0 kg	1
4.1 - 6.0 kg	1 1/2
6.1 - 8.0 kg	2
8.1 - 10 kg	2 1/2

Durata tratamentului

Pentru o singură administrare.

Recomandări privind administrarea corectă

Tabletele sunt administrate direct sau încorporate în carne sau cârnați. Nu sunt necesare măsuri dietetice. Tabletele sunt marcate în jumătăți.

Nu scoateți tabletele din blister până nu este necesar pentru utilizare. Orice tabletă utilizată parțial trebuie aruncată.

Timp de așteptare

Nu este cazul.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie {EXP}.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: Orice tabletă utilizată parțial trebuie aruncată.

Atenționări speciale

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pentru o bună igienă, persoanele care administrează tableta direct pisicii sau o încorporează în hrană, trebuie să se spele pe mâini după aceea.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Drontal Cat nu va fi utilizat în timpul gestației (vezi *Contraindicații*). Poate fi utilizat în timpul lactației.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Simptomele de supradozare nu apar la doze de 5 ori mai mari decât doza recomandată.

Primele semne de intoxicație sunt vărsăturile.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Alte informații**Natura și compoziția ambalajului primar**

Blistere Al/PE cu folie de aluminiu cu 2, 6 sau 20 tablete în cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Deținătorul Autorizației de Comercializare

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania.