

**Kiltix zgardă**  
pentru câini de talie mică  
**Kiltix zgardă**  
pentru câini de talie mijlocie  
**Kiltix zgardă**  
pentru câini de talie mare

**Compoziție**

	Lungime	Greutate	Propoxur	Flumetrin
Kiltix zgardă, pentru câini de talie mică	35 cm	12,5 g	1,25 g	0,28 g
Kiltix zgardă, pentru câini de talie mijlocie	48 cm	30,2 g	3,02 g	0,68 g
Kiltix zgardă, pentru câini de talie mare	66 cm	45,0 g	4,50 g	1,013 g

**Indicații**

În tratamentul infestațiilor cu căpușe (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) și purici (*Ctenocephalides canis / felis*) și pentru protejare împotriva reinfestării. După aplicare zgarda este eficientă împotriva căpușelor și puricilor până la 7 luni.

**Contraindicații**

A nu se utiliza la câini care au leziuni întinse ale piele. A nu se utiliza la animale bolnave sau în convalescență.

**Reacții adverse**

Ocazional, ușoară mâncărime poate fi observată în primele zile după aplicarea zgărzi. În caz de reacții de hipersensibilitate zgarda va fi îndepărtată imediat. Dacă sunt necesare măsurile de contracarare descrise în secțiunea "Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi)" vor fi luate.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

**Specii țintă**

Câini.

**Posologie pentru fiecare specie, cale de administrare și mod de administrare**

Câini de talie mică primesc o zgardă de 35 cm lungime (12.5 g),  
Câini de talie mijlocie primesc o zgardă de 48 cm lungime (30,2 g),  
Câini de talie mare primesc o zgardă de 66 cm lungime (45 g).

Zgarda se scoate din punga de protecție, se desface și se îndepărtează bucățile de plastic rezultate din procesul de turnare, aflate pe partea interioară a zgărzii. Se fixează zgarda în jurul gâtului iar partea rămasă liberă se introduce în cataramă. Verificați periodic dacă zgarda este aplicată corect și dacă este confortabilă pentru animal. Zgarda trebuie purtată tot timpul. Indiferent dacă câinele se odinește sau se plimbă zgarda este eficientă.

**Recomandări privind administrarea corectă**

De zece ori mai mulți purici sunt prezenți în așternut și în jurul animalului de companie (covoare și draperii) și de aceea trebuie regulat utilizate substanțe paraziticide și aspirate aceste locuri. Aceste măsuri ajută la reducerea infestării cu purici din mediul înconjurător și crește eficacitatea împotriva unor noi infestări ale câinelui.

Câini care au blana aspră, încurcată sau murdară trebuie spălați și șamponați înainte de aplicarea zgărzi. Contactul frecvent cu apa (ploaia, înotul, îmbăierea) pot reduce eficacitatea produsului.

Eficacitatea și durata efectivă de utilizare este determinată de lungimea, grosimea și condiția blănii dar și de presiunea parazitărilor. Dacă eficacitatea produsului se diminuează este necesar să fie înlocuită mai repede.

În unele cazuri căpușele se pot urca pe câine, chiar dacă acesta are zgardă. Căpușele se ascund în blană însă cad apoi în maxim 3 zile fără să fi supt sânge.

**Timp de așteptare**

Nu este cazul.

**Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie (Exp)

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 60 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: după deschiderea ambalajului zgarda trebuie aplicată imediat.

**Atenționări speciale****Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Zgarda este destinată pentru utilizare ca acaricid și insecticid de uz extern și nu trebuie înghițită de câini sau oameni.

**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

A se evita contactul îndelungat cu zgarda în timpul aplicării.

Spălați mâinile cu apă din abundență după manipularea produsului. Persoanele care sunt sensibile la substanțele din compoziția produsului trebuie să evite contactul cu zgarda.

Animalele care poartă zgarda KILTIX - se vor ține la distanță de bebeluși și copii mici.

**Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor**

Kiltix nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, deoarece este toxic pentru pești și alte organisme acvatice. Kiltix este toxic pentru albine. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**Alte informații**

Vânzare liberă; se eliberează fără prescripție.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

**Deținătorul Autorizației de Comercializare**

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania.