

Veraflox 25 mg/ml

suspensie orală pentru pisici

Compoziție

Suspensie orală care conține:

Pradofloxacină 25 mg/ml;

Conservant:

Acid sorbic (E200) 2 mg/ml.

Modul de prezentare al produsului: suspensie de culoare gălbuie până la bej.

Indicații

Tratamentul:

- infecțiilor acute ale tractului respirator superior, cauzate de tulpini sensibile de *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli* și din grupul *Staphylococcus intermedius* (inclusiv *S. pseudintermedius*).
- rănilor infectate și abceselor în infecțiile determinate de tulpini sensibile de *Pasteurella multocida* și din grupul *Staphylococcus intermedius* (inclusiv *S. pseudintermedius*).

Contraindicații

Nu se utilizează la pisici cu hipersensibilitate cunoscută la fluorochinolone.

Din cauza lipsei de date, pradofloxacina nu ar trebui să fie utilizată la pisoi cu vârstă mai mică de 6 săptămâni.

Pradofloxacina nu are efecte asupra cartilajelor în curs de dezvoltare la pisoi cu vârsta de 6 săptămâni și mai mari. Cu toate acestea, produsul nu trebuie să fie utilizat la pisici cu leziuni prezente ale cartilajului articular, deoarece aceste leziuni se pot agrava în timpul tratamentului cu fluorochinolone.

Nu se utilizează la pisici cu tulburări ale sistemului nervos central (SNC), cum ar fi epilepsia, fluorochinolonele ar putea provoca convulsii la animalele predispuse.

Nu se utilizează la pisici în timpul sarcinii și alăptării (a se vedea punctul 11 "Atenționări speciale").

Reacții adverse

Ușoare tulburări gastro-intestinale tranzitorii, inclusiv vărsături au fost observate în cazuri rare, la pisici.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Pisici.

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare și mod de administrare

Administrare orală.

Dozele

Doza recomandată de pradofloxacină este de 5,0 mg / kg greutate corporală o dată pe zi. Având în vedere modul în care este gradată seringa, doza este cuprinsă între 5,0 – 7,5 mg/ kg greutate corporală, în conformitate cu tabelul de mai jos.

Greutatea corporală a pisicilor (kg)	Doza de suspensie orală ce trebuie administrată (ml)	Doza de pradofloxacină (mg/ml greutate corporală)
> 0,67 - 1	0,2	5 - 7,5
1 - 1,5	0,3	5 - 7,5
1,5 - 2	0,4	5 - 6,7
2 - 2,5	0,5	5 - 6,3
2,5 - 3	0,6	5 - 6
3 - 3,5	0,7	5 - 5,8
3,5 - 4	0,8	5 - 5,7
4 - 5	1,0	5 - 6,3
5 - 6	1,2	5 - 6
6 - 7	1,4	5 - 5,8
7 - 8	1,6	5 - 5,7
8 - 9	1,8	5 - 5,6
9 - 10	2,0	5 - 5,6

Durata tratamentului


Acest produs trebuie administrat atât timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră veterinar. Durata tratamentului depinde de natura și gravitatea infecției, precum și de eficiența acestui medicament asupra animalului dumneavoastră de companie. Pentru majoritatea infecțiilor următoarele durate de tratament sunt recomandate:

Indicații	Durata tratamentului (zile)
Răni infectate și abcese:	7
Infecții acute ale tractului respirator superior:	5

Solicitați sfatul medicului veterinar dacă nu se observă o îmbunătățire a stării clinice în 3 zile după începerea tratamentului.

Recomandări privind administrarea corectă

Suspensia orală trebuie să fie administrată oral direct așa cum este arătat mai jos:



A se agita înainte de utilizare.

Extrageți doza necesară în seringă.

Administrați direct în cavitatea bucală.

Pentru a se evita contaminarea încrucișată, aceeași seringă nu ar trebui să fie folosită pentru diferite animale. Astfel, o seringă ar trebui să fie folosită numai pentru un singur animal. După administrare, seringă trebuie să fie curățată cu apă potabilă și depozitată în cutia de carton împreună cu produsul.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra flaconul închis ferm.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă sau cutie

Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului 3 luni.

Atenționări speciale

Ori de câte ori este posibil, Veraflox va fi utilizat numai având la bază testele de sensibilitate.

Reglementările oficiale și locale referitoare la substanțele antimicrobiene trebuie luate în considerare atunci când produsul este utilizat.

Fluorochinolonele vor fi păstrate ca rezervă pentru tratamentele care în condiții clinice răspund puțin sau care vor răspunde puțin la alte clase de substanțe antimicrobiene.

Utilizarea necorespunzătoare a produsului medicinal veterinar așa cum se menționează în instrucțiunile RCP poate favoriza răspândirea bacteriilor rezistente la fluorochinolone și poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte chinolone, determinată de posibila rezistență încrucișată.

Pradofloxacină poate crește sensibilitatea pielii la soare. De aceea în timpul tratamentului, animalele, nu ar trebui să fie expuse la soare excesiv.

Interacțiuni:

Sunt câteva produse medicinale care nu trebuie să fie administrate în timpul tratamentului deoarece dacă sunt administrate împreună pot determina reacții adverse grave. Vă rugăm să spuneți medicului veterinar despre toate medicamentele pe care intenționați să le administrați animalului.

Prin urmare, Veraflox nu trebuie utilizat concomitent cu antiacide, sucralfat, multivitamine sau produse lactate, deoarece absorbția de Veraflox poate fi scăzută. Mai mult, fluorochinolonele nu trebuie să fie utilizate în asociere cu medicamentele anti-inflamatoare non-steroidiene la animalele care au prezentat în trecut convulsii din cauza potențialelor interacțiuni farmacodinamice din SNC. Combinația de fluorochinolone cu teofilină ar putea crește concentrațiile plasmatice ale teofilinei, prin modificarea metabolismului și prin urmare ar trebui să fie evitate. Utilizarea combinată a fluorochinolonei cu digoxina, de asemenea, ar trebui să fie evitate, deoarece biodisponibilitatea orală a digoxinei este crescută.

Supradozare:

În caz de supradozare pot apărea simptome ca vomă și fecale moi. Nu se cunosc antidoturi specifice pentru pradofloxacină (sau alte fluorochinolone) prin urmare, în caz de supradozare, tratamentul administrat trebuie să fie simptomatic.

Gestație, lactație, fertilitate:

Siguranța produsului Veraflox nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației.

Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestație. Pradofloxacină a indus malformații fetale ale ochilor și toxicitate maternă la dozele administrate la șoareci. Nu se va utiliza în timpul lactației deoarece nu există date privind pradofloxacină la pisoi cu vârsta mai mică de 6 săptămâni. Fluorochinolone sunt cunoscute ca substanțe care traversează placenta și pot difuza în lapte. Nu au fost demonstrate efecte asupra fertilității la animale de reproducție.

Pentru utilizator:

Deoarece au efecte potențiale dăunătoare flaconul și seringă plină, nu se lasă la îndemâna și vederea copiilor.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fluorochinolone trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Evitați contactul produsului cu pielea și ochii. Spălați-vă mâinile după utilizare.

În caz de contact accidental cu ochii, se vor spăla imediat cu apă curată.

În caz de contact cu pielea se va clătii cu apă.

A nu se consuma alimente și băuturi pe durata utilizării. Fumatul este interzis pe durata utilizării.

În caz de înghițire accidentală, consultați imediat medicul și arătați prospectul sau eticheta.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Alte informații

Veraflox suspensie orală este disponibil în două prezentări diferite:

flacon de 15 ml și seringă pentru dozare.

flacon de 30 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Deținătorul Autorizației de Comercializare

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania