

Drontal Plus 35 kg comprimate pentru câini

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Germania

Producător pentru eliberarea seriei:

KVP, Pharma-und Veterinar Produkte GmbH, Str. Projensdorfer nr. 324, 24106 Kiel, Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Drontal Plus 35kg, comprimate pentru câini febantel, pirantel embonat, praziquantel

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (IN GREDIENȚI)

1 comprimat (2718 mg) conține:

Substanțe active:

Febantel	525,0 mg
Pirantel embonat	504,0 mg
Praziquantel	175,0 mg

4. INDICAȚII

Pentru tratamentul infestațiilor mixte determinate de viermi rotunzi, tenii și *Giardia spp.*, la câini.

Viermi rotunzi:

Ascarizi *Toxocara canis*
Toxascaris leonina

Viermi cu cârlig *Uncinaria stenocephala*
Ancilostoma caninum

Viermi bici *Trichuris vulpis*

Tenii (viermi lați):

Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Dipilidium caninum
Taenia spp.
Multiceps multiceps
Mesocestoides spp.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.
Nu se va utiliza la câinii care au o greutate corporală mai mică de 20 kg.

6. REACȚII ADVERSE

În cazuri foarte rare, tulburări ale tractului digestiv tranzitorii, ușoare (de exemplu: stări de vomă) ar putea să apară.
Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru administrare orală.

Doza recomandată este de 15 mg febantel, 14,4 mg pirantel embonat și 5 mg praziquantel/kg greutate corporală. Aceasta corespunde la 1 comprimat pe 3 5 kg greutate corporală.

Administrarea dozei corecte este specificată în următorul tabel, ca un tratament cu o singură administrare orală.

Câini	
Greutatea corporală (Kg)	Număr de comprimate
<20	Pentru câini de talie mai mică se va utiliza comprimatul corespunzător greutății corporale
>20-<35	1
> 35 - <55	1 ½
>55- <70	2

Durata tratamentului:

Infestarea cu viermi rotunzi și tenii

Pentru deparazitări periodice ale câinilor adulți aceștia vor fi tratați la fiecare 3 luni. Pentru tratament de rutină este recomandată o singură doză.

Infestarea cu *Giardia spp.*

Se administrează trei zile consecutive.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Comprimatele pot fi administrate direct pe cale orală sau pot fi încorporate în hrană. Nu sunt necesare măsuri dietetice (înfometare) înainte sau după tratament. Se recomandă ca tratamentul să se efectueze înainte de hrănire.

Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare. A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru fiecare specie țintă

Se vor evita următoarele practici care pot crește riscul dezvoltării rezistenței și pot avea ca rezultat final ineficiența tratamentului:

- Utilizarea prea frecventă și repetată a unor antihelmintice din aceeași clasă, pentru o perioadă lungă de timp.
- Subdozarea care poate fi cauzată de subestimarea greutății corporale sau de necalibrarea dispozitivelor de dozare (dacă este cazul).

Cazurile clinice suspecte de rezistență la antihelmintice trebuie investigate în continuare prin metode adecvate (ovocoprosopie, etc.). Dacă rezultatele testelor indică clar instalarea rezistenței față de un anumit antihelmintic, se va utiliza un alt antihelmintic din altă clasă farmacologică și care are un mod diferit de acțiune.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Pentru câini cu greutatea corporală sub 20 kg trebuie utilizate comprimate pentru câini de talie mică.

În cazul câinilor infestați cu *Giardia spp.*: a se curăța cu atenție și a se dezinfecta adăpostul sau a se muta câinele care este în tratament, situație specifică în câinise.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pentru o bună igienă, persoanele care administrează comprimatul direct câinelui sau o încorporează în hrană, trebuie să se spele pe mâini după utilizare.

Giardia spp. poate infesta oamenii, de aceea vă rugăm să solicitați sfatul medicului în cazul în care câinele dumneavoastră este infestat!

În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active trebuie să evite contactul cu produsul.

Gestație și lactație

Drontal Plus 35 kg nu trebuie utilizat în timpul primelor două treimi de gestație.
Drontal Plus 35 kg poate fi utilizat în timpul lactației.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

A nu se utiliza împreună cu levamisol, cu alte medicamente care au acțiune asupra sistemului colinergic sau cu piperazină.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot)

Doze de 10 (zece) ori mai mari decât doza recomandată de Drontal Plus au fost tolerate fără semne de toxicitate la câini și căței.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR,

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. ALTE INFORMAȚII

Ambalaje:

Blister din PVC termolipit cu folie de aluminiu x 2 comprimate; x 10 comprimate.
Cutie de carton care conține 1, 2, 5, 10 blistere.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.