

Bayofly pour on

Compoziție

Ciflutrin 100 mg/ml.

Forma farmaceutică

Soluție pour on.

Dimensiunea ambalajului

500 ml.

Specii țintă

Bovine.


Indicație (indicații)

Împotriva infestațiilor cu muște și tabanide (*Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea spp.*, *Haematopota spp.*) la bovinele pe pășune inclusiv la vacile pentru lapte.

Mod și cale de administrare

0.2 mg ciflutrin pe kg greutate vie care corespunde la 10 ml Bayofly® pour on pe 500 kg greutate vie.

Metoda de aplicare: Bayofly® pour on A.U.V. este o soluție gata de utilizare, care se aplică în lungul coloanei vertebrale pe spatele animalului.



Vacile în lactație vor fi tratate după muls. În funcție de nivelul reinfestării se repetă după 4-6 săptămâni.

Temp de așteptare

Bovine țesuturi comestibile: 0 zile. Bovine lapte: 0 zile.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Doar pentru uz extern.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

În timpul administrării produsului se va purta echipament de protecție (cizme, mănuși de protecție și ochelari de protecție). Contactul cu pielea, ochii și mucoasele trebuie evitat.

În cazul în care produsul ajunge pe piele spălați imediat cu săpun și apă. Ochii trebuie clătiți din abundență cu apă. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul administrării.

Condiții speciale de depozitare

A se păstra la temperatură mai mică de 30 °C

A nu se refrigera. A se proteja de lumină.

Precauții speciale pentru eliminarea produselor neutilizate sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Bayofly® pour-on este periculos pentru albine. Bayofly® pour-on nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR.

Reacții adverse: După administrarea produsului ca și la alți piretroizi pot apărea semne de iritație și neliniște care sunt tranzitorii.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.