

Bolfo 4,442 g

zgardă antiparazitară, pentru câini de talie mare

Compoziție

O zgardă de 45 g conține:

Substanță activă:

Propoxur 4,442 g;

Excipienți:

N dibutil-adipat, propilen glicol dicaprilocaprat, ulei de soia epoxidat, acid stearic, amestec de pigmenți (dioxid de titan, oxid roșu de fier, oxid galben de fier, oxid negru de fier), policlorură de vinil (PVC).

Indicație

Pentru prevenirea și combaterea puricilor și căpușelor la câini.

Contraindicații

A nu se folosi la animale care constituie sursă de hrană.

Reacții adverse

În primele zile de utilizare, animalele mai sensibile pot prezenta ușoară sensibilitate cutanată sau prurit ușor.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

Specii țintă

Câini (≤ 10 kg).

Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare și mod de administrare

Bolfo zgardă (66cm) se utilizează pentru câinii de peste 10 kg.

Doar pentru uz extern!

Zgarda oferă o protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni, iar împotriva căpușelor pe o durată de 10 săptămâni. Zgarda Bolfo este eficientă împotriva puricilor și căpușelor numai dacă este folosită în mod continuu.

Puricii de pe câine sunt omorâți la câteva ore după atașarea zgărzii. Căpușele sunt omorâte în aproximativ o zi de la atașarea zgărzii. Căpușele moarte fie cad de pe corpul câinelui, fie pot fi îndepărtate foarte ușor. Pierderea efectului se poate verifica prin zgărirea zgărzii cu un obiect metalic. Dacă locul zgăriat este alb, zgarda are încă efect. În caz contrar, trebuie utilizată o zgardă nouă.

Rareori se poate întâmpla să existe totuși căpușe pe animalul care poartă zgarda Bolfo. Aceste căpușe se ascund doar în blană și vor cădea de pe animal fără a absorbi sângele.

Recomandări privind administrarea corectă

Scoateți zgarda din învelișul protector și desfăceți-o. Puneți zgarda în jurul gâtului animalului. Dacă e corect pusă, între zgardă și gâtul animalului ar trebui să fie un spațiu în care să încapă două degete.

Zgarda devine eficientă la 24 ore de la punerea ei la gâtul animalului. Durata și nivelul de eficiență depind de grosimea și lungimea părului, de activitățile animalului și de nivelul infestării.

Este de preferat să spălați părul animalului, dacă nu este curat, înainte de punerea zgărzii.

Zgarda este rezistentă la apă, dar este de preferat a fi scoasă înainte de baie sau de înot și pusă la loc imediat după uscarea părului.

Puricii pot fi gazde interimare pentru tenii, de aceea este bine să folosiți în paralel și medicamente endoparaziticide. De asemenea, mediul înconjurător poate găzdui purici, ouă sau larve de purici. Acestea vor evolua în timp în purici. De aceea, pentru un tratament eficient împotriva puricilor, este necesară stropirea cu insecticide adecvate a mediului înconjurător din imediata apropiere a câinelui dumneavoastră.

Timp de așteptare

Nu este cazul.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se folosi după data expirării înscrisă pe cutia de carton după {EXP}.

Atenționare specială

Nu lăsați câinii cu această zgardă în apropierea copiilor sau a bebelușilor.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

A nu se folosi la câinii bolnavi sau în perioada de convalescență.

A nu se folosi la animalele care alăptează.

A nu se folosi la căței de până în 3 luni.

A nu se folosi la câinii cu leziuni ale pielii.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul direct cu pielea.

Purtați mănuși de protecție în timpul atașării zgărzii.

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul atașării zgărzii.

Utilizare în perioada de gestație, lactație

Lactație: A nu se folosi la animalele aflate în perioada de lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu tratați animalul dumneavoastră cu alte insecticide în același timp cu folosirea zgărzii.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice.

Dacă accidental părți din zgardă sunt înghițite, ar putea să apară salivări excesive, vomă, contracții ale pupilelor, diaree. În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar. Antidot: Atropină sulfat.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului

Ambalare

O zgardă cu dimensiunea de 66 cm este ambalată în folie de poliester/polietilenă, sigilată în vid și apoi introdusă într-o cutie de carton.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Deținătorul Autorizației de Comercializare

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania.