

## Nobilis Paramyxo<sub>P201</sub>

vaccin ce conține paramixovirus inactivat pentru porumbei

### NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

#### Deținătorul autorizației de comercializare

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstr. 35  
5831 AN Boxmeer  
Olanda  
Tel.: +31 / 485 587 600  
Fax: +31 / 485 577 333

#### Producător pentru eliberarea seriei:

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstr. 35  
5831 AN Boxmeer  
Olanda  
Si  
Laboratorios Intervet SA  
Poligono El Montalvo, Apartado 3006  
Salamanca, Spain

### DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

**Nobilis Paramyxo<sub>P201</sub>**, vaccin ce conține paramixovirus inactivat pentru porumbei

### DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Per doză de 0.25 ml:

Antigen paramixovirus columbar -1 (PPMV-1) tulpina P201, inactivată : ce induce  $\geq 6.8 \log_2 \text{IH}^+$  și  $\leq 10.2 \log_2 \text{unități IH}^+$  la puii de gaina  
Inhibarea Hemaglutinării

#### **Adjuvant:**

parafină lichidă  
Excipienți:  
Polisorbat 80  
Sorbitan mono-oleat  
Glicina  
Apa pentru injectii

#### **INDICAȚII**

Imunizarea activă a porumbeilor pentru reducerea semnelor clinice produse de infecția cu tulpina virulentă a PPMV-1. S-a demonstrat că vaccinul reduce și excreția de virus după infecția de control.

Debutul imunității: 4 săptămâni după vaccinarea primară.

S-a demonstrat o durată a imunității de un an.

#### **CONTRAINDICAȚII**

Nu se vaccinează porumbeii bolnavi.

#### **REAȚII ADVERSE**

Nu s-au observat efecte adverse după vaccinare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

#### **SPECII ȚINTĂ**

Porumbei.

#### **POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Fiecare pasăre va fi injectată cu 0,25 ml vaccin pe cale subcutanată în regiunea dorsală a gâtului.

Porumbeii tineri pot fi vaccinați începând cu vârsta de 5 săptămâni.

Se recomandă revaccinare anuală.

#### **RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15 - 25°C). Se va agita bine flaconul înainte de folosire. Se va folosi echipament steril de vaccinare.

#### **TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

#### **PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C) .

A se feri de îngheț.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: se va folosi imediat.

**ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Nu există.

Pentru utilizator:

Acest produs conține ulei mineral. Auto-injectarea/injectarea accidentală poate provoca dureri puternice și inflamații, în special dacă injectarea se face în articulație sau în deget, iar în cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate îngrijiri medicale imediat.

În cazul unei injectări accidentale cu acest produs, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs.

Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului.

Pentru medic:

Acest produs conține ulei mineral. Chiar dacă au fost injectate cantități mici de produs, injectarea accidentală cu acest produs poate provoca inflamație accentuată, care poate conduce, de exemplu, la necroză ischemică și chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată și spălarea zonei injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

Nu se utilizează la păsări cu mai puțin de 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de reproducție. Nu există informații disponibile privind siguranța utilizării produsului în timpul perioadei de reproducere.

**PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**ALTE INFORMAȚII**

Flacon cu 20 ml (80 doze), 50 ml (200 doze), și 250 ml (1000 doze) ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Intervet România S.R.L

Șos. de Centură nr.27 – 28,

Com. Chiajna., ILFOV