

# Advantix

## soluție spot-on pentru câini

### Compoziție

Fiecare doză (pipetă) conține:

	Pipeta	Imidacloprid	Permetrină	E321
Advantix soluție spot-on pentru câini până la 4 kg	0.4 ml	40 mg	200 mg	0.4 mg
Advantix soluție spot-on pentru câini de la 4 kg până la 10 kg	1.0 ml	100 mg	500 mg	1.0 mg
Advantix soluție spot-on pentru câini de la 10 kg până la 25 kg	2.5 ml	250 mg	1250 mg	2.5 mg
Advantix soluție spot-on pentru câini de peste 25 kg	4.0 ml	400 mg	2000 mg	4.0 mg

Excipienți: Butilhidroxitoluen 1.0 mg/ml (E321, ca antioxidant):

### Indicații

Pentru tratamentul și prevenirea infestării cu purici (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*).

Purici de pe câine sunt omorâți după o zi de la tratament. Un tratament previne viitoare infestări cu purici timp de patru săptămâni. Produsul poate fi utilizat ca parte a strategiei de tratament împotriva dermatitei alergice determinate de purici (FAD).

Produsul prezintă activitate acaricidă și repelentă (de îndepărtare) timp de până la patru săptămâni (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) sau trei săptămâni (*Dermacentor reticulatus*) împotriva infestațiilor cu căpușe.

Căpușele prezente deja pe câine s-ar putea să nu fie omorâte în două zile după tratament și să rămână atașate și vizibile. De aceea se recomandă îndepărtarea căpușelor prezente pe câine la momentul tratamentului pentru a se preveni atacul și hrănirea acestora cu sânge.

Un tratament asigură acțiune repelentă (anti-hrănire) împotriva flebotomilor timp de două săptămâni (*Phlebotomus papatasi*) sau trei săptămâni (*Phlebotomus perniciosus*) împotriva țânțarilor pentru două (*Aedes aegypti*) și patru (*Culex pipiens*) săptămâni și pentru musca de grajd (*Stomoxys calcitrans*) pentru patru săptămâni.

Flebotomi	<i>Phlebotomus perniciosus</i>	3 săptămâni
	<i>Phlebotomus papatasi</i>	2 săptămâni
Țânțari	<i>Aedes aegypti</i>	2 săptămâni
	<i>Culex pipiens</i>	4 săptămâni
Musca de grajd	<i>Stomoxys calcitrans</i>	4 săptămâni

### Contraindicații

În absența datelor disponibile produsul nu va fi folosit la căței cu vârsta mai mică de 7 săptămâni.

Nu se utilizează în cazuri cunoscute cu hipersensibilitate la substanțele active.

Nu se utilizează la pisici.

### Reacții adverse

Rareori poate apare o sensibilitate dermică tranzitorie (cu creșterea pruritului, alopecie și eritem la locul de aplicare) sau apatie.

Otrăvirea câinilor după ingerare accidentală poate apare în cazuri rare. În aceste cazuri pot să apară și semne neurologice cum sunt tremurături și apatie. Se va aplica un tratament simptomatic, sub supravegherea medicului veterinar. Nu există antidot specific.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

### Specii țintă

Câini.

### Posologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare și mod de administrare

Schema de dozare:

Doza minimă recomandată este de: 10 mg / kg greutate vie (g.v.) imidacloprid și 50 mg / kg greutate vie (g.v.) permetrină echivalent cu 0.1ml/kg g.v. **Advantix soluție spot-on pentru câini.**

Greutatea câinelui (kg)	Dimensiunea pipetei ce va fi utilizată	Volum (ml)	Imidacloprid (mg/kg g.v.)	Permetrină (mg/kg g.v.)
≤ 4 kg	Advantix soluție spot-on pentru câini până la 4 kg	0.4 ml	minim 10	minim 50
>4 kg - 10 kg	Advantix soluție spot-on pentru câini de la 4 kg până la 10 kg	1.0 ml	10 - 25	50 - 125
>10 kg -25 kg	Advantix soluție spot-on pentru câini de la 10 kg până la 25 kg	2.5 ml	10 - 25	50 - 125
>25 kg - 40 kg	Advantix soluție spot-on pentru câini de peste 25 kg	4.0 ml	10 - 16	50 - 80
> 40 kg	se va utiliza combinația de pipete potrivită			


Pentru câinii.

Pentru a reduce re-infestările cu noi purici este recomandat să fie tratați toți câinii dintr-o familie (gospodărie). Alte animale de companie din aceeași familie sau gospodărie trebuie tratate cu produse corespunzătoare. Pentru purici proveniți din mediul înconjurător al animalului se recomandă utilizarea adițională a unui produs corespunzător pentru tratamentul împotriva puricilor adulți și a stadiilor lor de dezvoltare.

Produsul este activ chiar dacă animalul este ud. Oricum expunerea prelungită la apă trebuie evitată. În cazul în care se produce expunere prelungită la apă eficacitatea produsului scade. Chiar și în acest caz nu trebuie tratat mai frecvent de o dată pe săptămână. Dacă este necesar ca animalul să fie spălat cu șampon este bine ca **Advantix soluție spot-on pentru câini** să fie aplicat după două săptămâni pentru a se asigura eficacitatea produsului.

#### Mod de administrare.

Scoateți o pipetă din pachet. Țineți pipeta în poziție verticală, răsuțiți capacul și îl scoateți. Întoarceți capacul invers și cu ajutorul lui desigilați pipeta (prin răsucire și apăsare asupra sigiliului, ca în fotografie).



Pentru câini cu greutatea corporală de 10 kg sau mai puțin:

Câinele așezat în picioare, îndepărtați părul dintre umeri, până ce pielea devine vizibilă. Aplicați vârful pipetei direct pe piele și prin strângere fermă de câteva ori se golește conținutul pipetei. A se aplica numai pe pielea fără leziuni.



Pentru câini cu o greutate corporală mai mare de 10 kg:

Câinele așezat în picioare, întregul conținut al pipetei de **Advantix soluție spot-on pentru câini** va fi aplicat în mod egal în patru locuri începând dintre umeri și până la baza cozi. În fiecare loc îndepărtați părul până ce pielea devine vizibilă. Aplicați vârful pipetei pe piele și strângând ușor eliberați o parte din soluție pe piele.



#### Recomandări privind administrarea corectă

Numai pentru uz extern.

A se aplica numai pe pielea fără leziuni.

A nu se aplica o cantitate mare de soluție într-un singur loc pentru că aceasta poate curge pe părțile laterale ale câinelui.

#### Timp de așteptare

Nu este cazul.

#### Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A nu se congela.

După deschiderea pungii de aluminiu a se păstra în loc uscat și a nu se păstra la temperatură mai mare de 30°C.

Abrevierea utilizată pentru data expirării pe etichetă, pipetă și pungă este EXP.

#### Precauții speciale pentru utilizare la animale

Conținutul pipetei nu trebuie să vină în contact cu ochi și gura câinelui care primește tratamentul.

Atenție pentru administrarea corectă a produsului așa cum a fost descrisă în secțiunea *Mod de administrare*. În mod particular ingestia orală prin linsul locului de aplicare sau contactul cu alte animale va fi evitat.



A nu se utiliza la pisici.

Acest produs este foarte toxic pentru pisici și poate determina moartea datorită particularităților fiziologice ale pisicilor care nu sunt capabile să metabolizeze anumiți compuși inclusiv permetrină. Pentru a preveni expunerea accidentală a pisicilor la acest produs câinii tratați vor fi ținuți separat de pisici după tratament până când locul de aplicare este uscat. Se vor lua măsuri pentru ca pisicile să nu lingă locul de aplicare al câinilor care au fost tratați cu acest produs. Solicitați imediat asistența medicului veterinar dacă acest lucru se întâmplă.

Consultați-vă medicul veterinar înainte de utilizarea acestui produs la animale bolnave și debile.

Deoarece produsul este periculos pentru organismele acvatice, câinii tratați nu vor fi lăsați în nici un caz să intre în orice ape de suprafață pentru cel puțin 48 de ore după tratament.

#### Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Evitați contactul cu pielea, ochii sau gura.

Nu mâncați, nu beți, nu fumați în timpul aplicării produsului.

Spălați bine mâinile după aplicarea produsului.

Dacă produsul ajunge accidental pe piele spălați imediat zona cu săpun și apă.

Persoanele cunoscute cu sensibilitate la nivelul pielii pot fi în mod particular sensibile la acest produs.

Dacă produsul ajunge accidental în ochi, spălați ochii cu multă apă. Dacă simptomele cutanate sau oculare persistă, sau produsul este înghițit accidental, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului.

Câini tratați nu trebuie lăsați să se joace în special cu copiii până când locul de aplicare nu este uscat. Pentru a fi siguri, tratați câini de exemplu seara. În acest caz câinii tratați nu au permisiunea să doarmă împreună cu proprietarii lor, în mod special dacă aceștia sunt copii.

#### **Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz**

După utilizare pune-ți capacul înapoi pe pipetă. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

#### **Alte informații**

**Advantix soluție spot-on pentru câini** este un ectoparaziticid pentru utilizare locală care conține imidacloprid și permetrină. Această combinație acționează ca insecticid, acaricid și ca repelent.

**Imidacloprid** este un ectoparaziticid aparținând grupului de compuși cloronicotinil. Din punct de vedere chimic poate fi clasificat ca cloronicotinil nitroguanidină. Imidaclopridul este eficient împotriva puricilor adulți și a stadiilor lor larvare. În plus față de eficacitatea manifestată față de puricii adulți, s-a demonstrat și eficacitatea larvicidă a substanței pentru locurile din habitatul animalului..

Produsul asigură acțiune repelentă (anti-hrănire) împotriva căpușelor, flebotomilor și țânțarilor iar în acest mod se previne hrănirea paraziților cu sânge și reducerea riscului de transmitere a bolilor transmise prin vectori (Canine Vector-Borne Disease sau CVBD, ca de exemplu, borelioză, ricketioză, erlichioză, leishmanioză).

Poate fi utilizat în timpul gestației și lactației.

Solventul din **Advantix soluție spot-on pentru câini** poate păta anumite materiale cum ar fi piele, țesături, plastic și suprafețe finite. Lăsați locul de aplicare să se usuce înainte de contactul cu astfel de materiale.

#### **Ambalaj:**

Pipete de 0.4 ml , 1.0 ml , 2.5 ml, 4.0 ml

Blister care conține 1, 2, 3, 4 sau 6 pipete individuale.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

#### **Deținătorul Autorizației de Comercializare**

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Germania.