

Chronogest CR, 20 mg

burete intravaginal cu eliberare controlată pentru ovine si caprine.

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Producător pentru eliberarea seriei:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
F-27460 Igoville
Franța

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Chronogest CR, 20 mg, burete intravaginal cu eliberare controlată pentru ovine si caprine.
Acetat de flugeston(cronolon)

DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Fiecare burete conține:

Substanță activă:

Acetat de flugeston(cronolon): 20 mg

Lista excipienților

Hidroxiopropil celuloză
Polietilen glicol
Apă purificată

INDICAȚII

La oi și mioare, în combinație cu PMSG (Gonadotropină serică de iapă gestantă)
Inducerea și sincronizarea estrului și a ovulației (la oi și mioare care nu sunt în călduri, în perioada anestrului).
Sincronizarea estrului și a ovulației (la oi și mioare în călduri).
La caprine:
Sincronizarea și inducerea ovulației în combinație cu PGF2α si PMSG

CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

REAȚII ADVERSE

Nu sunt.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Ovine (oi și mioare), caprine.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza este de un burete per animal independent de greutatea corporală, rasă, tip și anotimp.
Buretele Chronogest CR se administrează intra-vaginal cu ajutorul unui aplicator.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Ovine (oi și mioare):

Durata de păstrare a buretelui în interiorul vaginului este de 14 zile. La sfârșitul perioadei de administrare, buretele este îndepărtat ușor, trăgând de șnur.

Pentru a obține o sincronizare optimă a ovulației, se recomandă o injecție intra-musculară de PMSG (gama 300-700 UI) în momentul îndepărtării buretelui.

În cazul în care se aplică inseminarea artificială la un moment programat, se recomandă efectuarea acesteia la 55 ore după îndepărtarea buretelui.

Caprine:

Durata de păstrare a buretelui în interiorul vaginului este de 10-11 zile. La sfârșitul perioadei de administrare, Cronogest CR este îndepărtat ușor, trăgând de șnur.

Pentru a extinde ovulația, se recomandă o administrare injectabilă cu PGF2α si PMSG la caprine cu 48 de ore înainte de extragerea buretelui.

Animalele ovulează între 36 și 72 de ore după extragerea buretelui cu eliberare controlată.

TIMP DE AȘTEPTARE

Ovine:

Pentru sacrificare: 2 zile după eliminarea bureților.

Pentru lapte: zero zile, inclusiv perioada de tratament.

Caprine:

Pentru sacrificare: 5 zile după eliminarea bureților.

Pentru lapte: 3 zile după introducerea buretelui.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C

A se păstra în ambalajul original.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

După deschiderea ambalajului primar orice produs neutilizat trebuie eliminat.

ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu există.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale

ALTE INFORMAȚII

Pungi din poliester metalic/polietilena cu densitate scăzută, care conțin 10 bureți, 25 de bureți sau 50 de bureți.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.