

# PolyVar Yellow

275 mg, benzi pentru urdiniș

## 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare: Bayer Animal Health GmbH 51368 Leverkusen Germania

Producător responsabil pentru eliberarea seriei: KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel Germania

## 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PolyVar Yellow 275 mg benzi pentru urdiniș flumetrină

## 3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

Benzi galbene, din material plastic cu 15 găuri.

Substanță activă: o bandă pentru urdiniș conține 275 mg flumetrină

## 4. INDICAȚIE

Pentru tratamentul varroozei la albine melifere cauzată de acarieni *Varroa destructor* sensibili la flumetrină.

## 5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazuri de rezistență cunoscută împotriva piretroidelor așa cum este descris în secțiunea "Atenționări speciale".

## 6. REACȚII ADVERSE

Nu există.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

## 7. SPECII ȚINTĂ

Albine melifere.

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare în stup. Utilizați la urdiniș /intrarea în stupul de albine ca o poartă. Utilizați două benzi pentru fiecare stup de albine standard.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Aplicarea benzilor pentru urdiniș:

Tratamentul trebuie început într-un timp Scurt după cules și extracția mierii pentru a se asigura o activitate de zbor suficientă pentru un tratament eficient și dezvoltarea de albine sănătoase pentru iarnă. Tratamentul trebuie aplicat timp de cel puțin 9 săptămâni până la sfârșitul activității de zbor, dar nu mai mult de 4 luni. În cazul în care acarienii continuă să cadă la 9 săptămâni, tratamentul trebuie continuat. Astfel, tratamentul va acoperi, de obicei, faza critică cu potențialul de transfer orizontal al acarienilor, de exemplu, prin furțișag. Succesul tratamentului trebuie monitorizat, așa cum s-a menționat în secțiunea "Atenționări speciale".


Benzile pentru urdiniș ar trebui să fie montate la intrarea într-un mod în care albinele sunt forțate să intre sau să iasă din stup numai prin orificiile benzii. întreaga suprafață și găurile benzii de urdiniș nu ar trebui să fie acoperite pentru a se asigura contactul albinelor cu banda și pentru a asigura ventilarea stupului. Benzile sunt proiectate să nu afecteze îndepărtarea albinelor moarte. Benzile nu trebuie tăiate.

Acest pachet conține doar benzile pentru urdiniș, cu toate acestea, în funcție de tipul de stup de albine și dimensiunea urdinișului poate fi nevoie de alte instrumente, cum ar fi țințe, capse, cuie sau bucăți de lemn pentru a fixa banda în urdiniș. Benzile pot fi fixate în moduri diferite, din interiorul sau din exteriorul stupului.

Pentru tipurile de stup cu o intrare largă două benzi pot fi fixate în linie (a se vedea figura 3 a, b pentru exemplu stupi Boczonadi, Dadant, German normal, Langstroth, Simplex, Spaar-Kast și Zander).

Pentru stupi cu o intrare mică benzile pot fi fixate ca un paralelipiped în fața intrării (a se vedea figura 3c, de exemplu, stupi Layens, A-Z).

Exemple sunt ilustrate mai jos.



## 10. TIMP DE AȘTEPTARE

Miere de albine: Zero zile.

Nu utilizați în timpul culesului.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiții speciale de depozitare.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării înscrisă pe etichetă și cutie. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: trebuie utilizat imediat. Orice produs neutilizat trebuie eliminat.

## 12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru fiecare specie țintă:

Toate coloniile situate în aceeași stupină trebuie tratate simultan.

Produsul trebuie să fie utilizat ca parte a unui program integrat de combatere a Varroa.

Ca o metodă eficientă pentru a reduce riscul de selecție a rezistenței, se recomandă să se alterneze utilizarea PolyVar Yellow - ca și alte acaricide - nu va fi utilizat în anii consecutivi. În schimb, o rotație strictă cu produse care conțin substanțe active din alte clase chimice, ar trebui efectuată. În funcție de situația de rezistență regională o pauză de tratament mai mult de un an poate fi necesară. Deoarece flumetrina și tau-fluvalinatul fac parte din aceeași clasă, nu sunt potrivite pentru a se roti între ele.

Utilizarea necorespunzătoare a produsului ar putea conduce la un risc crescut de dezvoltare a rezistenței și ar putea conduce în cele din urmă la o terapie ineficientă și pierderi de colonii.

În general, se recomandă testarea susceptibilității acaricide la nivel regional, de exemplu, prin analize biologice sau analize moleculare (PCR). În cazul în care există rezistență la piretroizi PolyVar Yellow nu trebuie aplicat. Unde în trecut a fost observată rezistență la piretroide retestarea statutului actual al coloniei ar trebui să fie considerată, deoarece revenirea susceptibilității poate avea loc într-o perioadă de câțiva ani.

Activitatea de zbor este necesară pentru expunerea la substanța activă. În cazul unor perioade prelungite cu activitate de zbor redusă, de exemplu, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, eficacitatea poate fi redusă.

Succesul tratamentului trebuie monitorizat cu testele standard stabilite, cum ar fi monitorizarea continuă a căderii naturale de acarieni utilizând o tavă lipicioasă, sau evaluarea încărcării cu căpușe la 100 de albine pentru a determina dacă este necesar un tratament de iarnă, de exemplu cu acid oxalic.

Nu reutilizați benzile pentru urdiniș.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

După instalarea produsului albinele se pot aglomera la urdiniș pentru câteva ore, în timpul reglării.

O ventilație adecvată a stupului trebuie asigurată în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate.

PolyVar Yellow nu a fost testat în timpul perioadelor cu vreme extrem de caldă. Produsul poate avea impact asupra ventilației stupului similar cu reductorul standard de la urdiniș și prin urmare, ar trebui să fie eliminat temporar, dacă se consideră necesar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

A se ține punga cu benzile pentru urdiniș în ambalajul exterior până la utilizare.

Se spală mâinile cu apă rece, după montarea benzilor pentru urdiniș.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Nu utilizați simultan cu alte acaricide împotriva varroozei.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot!):

Din cauza naturii benzilor de urdiniș supradozarea este puțin probabilă și semne de supradozare nu sunt așteptate.

Incompatibilități:

Nu se cunosc.

## 13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

PolyVar Yellow (benzi sau plicuri goale), nu ar trebui să fie aruncat în cursuri de apă deoarece poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatice.

## 14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

## 15. ALTE INFORMAȚII

Pungă din folie poliester / aluminiu / polietilenă de joasă densitate

Dimensiuni de ambalaj:

Cutie care conține 1 pungă din folie (10 benzi pentru urdiniș).

Cutie care conține 10 pungi din folie (100 de benzi pentru urdiniș).

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Albinele sunt expuse la substanța activă prin contactul direct cu poarta de la intrarea și ieșirea din stup și indirect prin contactul social în interiorul stupului. Nu există o evaporare a substanței active.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.