

Desavit zoo[®]

Soluție vitamino-corticosteroidiană, injectabilă.

Descriere

Desavit zoo[®] se prezintă sub forma unui flacon ce conține o soluție injectabilă de culoare roșu închis.

Compoziție

100 ml conțin:	tiamină clorhidrat (vit. B ₁)	10 g,
	Dexametazonă	100 mg,
	ciancobalamină (vit. B ₁₂)	100 mg.

Indicații

În tratamentul afecțiunilor nervoase la bovine, ecvine, suine, canide și feline și în tratamentul cetozelor primare și secundare la vacile de lapte.

Mod de acțiune

Este un complex vitamino-corticosteroidian injectabil. Dexametazona, derivat sintetic al hidrocortizonului, la doze reduse are acțiune antiinflamatorie și mineralocorticoidă redusă (sau aproape nulă) și nu determină apariția fenomenelor colaterale nedorite (edeme, hipertensiune) ale terapiei cu corticosteroizi. La bovine dexametazona acționează în procese inflamatorii și cetoze datorită efectului gluconeogenetic, hiperglicemiant și anticetozic. Tiamina clorhidrică participă în metabolismul glucidic, inhibă acumularea acidului piruvic în țesuturi și îmbunătățește activitatea sistemului nervos. Ciancobalamina este factor principal în hematopoeză, participă la sinteza tecii de mielină, a nucleoproteinelor din celulele epiteliale și metioninei, fiind și un factor hepatoprotector.

Doze și mod de administrare

<i>Specia</i>	<i>Doza / animal</i>	<i>Mod de administrare</i>
Bovine și cabaline	10 ml	intramuscular profund
Vițe și mânji	5 ml	intramuscular profund
Porci	5-10 ml	intramuscular profund
Purci	0,5-1 ml	intramuscular profund
Câini și pisici	0,5-1 ml	intramuscular profund

Dacă este necesar tratamentul se repetă după 12-24 ore.

Contraindicații

Nu se administrează femelelor gestante în ultima perioadă a gestației (poate provoca parturiția prematură cu distocii, retenții placentare sau metrite).

Efecte adverse

În caz de tratament prelungit cu corticosteroizi pot să apară: retenția de sodiu și apă, pierderea de potasiu, polidipsia, poliuria, inhibiția activității suprarenalelor, osteoporoza.

Precauții

Nu se impun.

Perioada de așteptare

Carne: 5 zile.
Lapte: 5 zile (10 mulsori).

Păstrare

La temperatura camerei (15-25°C) și la întuneric.

Prezentare

Flacon de 100 ml.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa îndemâna copiilor.
Numai pentru uz veterinar.